UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Programa de Pós-Graduação em Fisiologia Vegetal

Tese

**Ação de herbicidas sobre a atividade fotossintética de
plantas com metabolismo C₃ e C₄**

Camila Pinho de Sousa

Pelotas, 2012

Camila Pinho de Sousa

Ação de herbicidas sobre a atividade fotossintética de plantas com metabolismo C₃ e C₄

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Fisiologia Vegetal da Universidade Federal de Pelotas, como requisito parcial a obtenção do título de Doutora em Fisiologia Vegetal.

Orientador: Dr. Marcos Antonio Bacarin

Pelotas, 2012

Dados de catalogação na fonte:
(Gladis Rejane Moran Ferreira – CRB – 10/1793)

S725a Sousa, Camila Pinho de

Ação de herbicidas sobre a atividade fotossintética de plantas com metabolismo C₃ e C₄/ Camila Pinho de Sousa – Pelotas, 2012.

122f.

Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Fisiologia Vegetal. Instituto de Biologia. Universidade Federal de Pelotas – Pelotas, 2012, Marcos Antonio Bacarin, Orientador.

1. Fluorescência da clorofila *a*2. OJIP3. PAM4. Trocas gasosas I. Bacarin, Marcos Antonio (orientador) II. Título

CDU 628.393:633.15+633.34

Banca Examinadora:

Prof. Dr. Marcos Antonio Bacarin (Presidente)

Prof^a. Dr^a. Diolina Moura Silva

Prof. Dr. Nei Fernandes Lopes

Dr^a. Emanuela Garbin Martinazzo

A Deus razão de tudo o que somos e fazemos.

*Ao meu marido Diogo pelo amor, incentivo, apoio incondicional,
companheirismo e suporte emocional, além dos sacrifícios e concessões.*

*A minha mãe Gladis, razão da minha existência e exemplo de amor com
que fui criada e educada.*

A minha família por sempre acreditar que eu alcançaria meus objetivos.

Dedico e ofereço

AGRADECIMENTOS

A Deus, Senhor da minha vida, por iluminar meu caminho e me dar forças para seguir sempre em frente, guiando meus passos e permitindo que este sonho se tornasse realidade;

Ao professor Marcos Antonio Bacarin, pela orientação, aprendizado, dedicação, paciência, sensibilidade e apoio ao longo desta jornada, e por ter sido compreensivo e um grande amigo nos momentos em que precisei;

Aos meus grandes amigos Ane, Cris, Manu, Anderson e Domi, pessoas tão queridas e especiais, que foram fundamentais para a concretização desta etapa, além de proporcionarem momentos de lazer e descontração, imprescindíveis ao bom andamento deste estudo;

Aos estagiários e bolsistas de iniciação científica Márcio, Aline e Lia, pelo auxílio na condução dos experimentos e pela amizade;

Aos colegas do Programa de Pós-graduação em Fisiologia Vegetal (PPGFV) pela convivência e apoio;

Aos professores e funcionários do PPGFV pelos ensinamentos e apoio recebido;

À banca pelas valiosas sugestões e trabalho dedicado a avaliação do presente estudo;

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pelo apoio financeiro durante o curso;

E por fim, a todos aqueles que de alguma maneira contribuíram para que esta tese se tornasse realidade,

MUITO OBRIGADO!

“Seja forte e corajoso! Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar”
Josué 1:9

RESUMO

SOUSA, Camila Pinho de. **Ação de herbicidas sobre a atividade fotossintética de plantas com metabolismo C₃ e C₄**. 2012. 122f. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-graduação em Fisiologia Vegetal. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas.

Este trabalho teve por objetivo determinar os parâmetros fisiológicos relacionados à fotossíntese por meio de análises da fluorescência da clorofila *a* transiente e modulada, e das trocas gasosas de discos foliares de plantas com metabolismo C₃ e C₄ submetidos a herbicidas inibidores do FSII, da síntese de carotenóides e da síntese das clorofilas. O experimento foi conduzido em casa-de-vegetação e laboratórios da UFPel, no município de Capão do Leão/RS. Foram avaliados discos foliares de milho e soja obtidos de folhas maduras de plantas em estágio vegetativo. O esquema fatorial utilizado foi 3x4, sendo o fator A o tipo de herbicida (bentazon, clomazone e fomesafen) e o fator B a concentração do herbicida (0µM, 100µM, 250µM e 500µM). Foram realizados dois ensaios distintos, sendo utilizadas 15 e 5 repetições por tratamento, respectivamente para o ensaio I e II. No ensaio I foi avaliado o efeito dos herbicidas sobre a fluorescência transiente da clorofila *a*, medida utilizando-se um fluorômetro portátil (HandyPEA, Hansatech). No segundo ensaio, foi avaliado o efeito dos herbicidas sobre a fluorescência modulada da clorofila *a* (cinética de relaxamento de fluorescência e curvas de fluorescência em resposta à luz) e trocas gasosas, medidas pelo analisador de gás no infravermelho (IRGA LI 6400XT, LI-COR). O herbicida bentazon foi o que mais afetou as intensidades de fluorescência da clorofila e os demais parâmetros obtidos através das duas técnicas utilizadas. Os herbicidas clomazone e fomesafen apresentaram pouca alteração dos parâmetros referentes à fluorescência transiente, sendo os parâmetros de fluorescência modulada e de trocas gasosas mais sensíveis à sua ação. Os índices de desempenho PI_{ABS} e $PI_{ABS\ total}$ foram os parâmetros de fluorescência transiente mais sensíveis à ação de bentazon, clomazone e fomesafen, enquanto que para a fluorescência modulada, F_S , F_M' , ETR e ϕ_{PSII} foram os parâmetros que demonstraram maior sensibilidade. As plantas de milho são menos sensíveis aos herbicidas bentazon, clomazone e fomesafen que a soja, sugerindo que plantas com metabolismo C₄, embora sofram com a ação dos herbicidas, apresentam capacidade de tolerância maior que as espécies com metabolismo C₃.

Palavras-chave: fluorescência da clorofila *a*, OJIP, PAM, trocas gasosas.

ABSTRACT

SOUSA, Camila Pinho de. **Action of herbicides on the photosynthetic activity of plants with C₃ and C₄ metabolism.** 2012. 122f. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-graduação em Fisiologia Vegetal. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas.

The objective of this research was to study the physiological parameters related to photosynthesis using chlorophyll a fluorescence and gas exchange on leaf discs from a C₃ and a C₄ plants submitted to PSII-inhibiting herbicides. Both transient and modulated chlorophyll a fluorescence were studied. The herbicides used affect the synthesis of carotenoids and the synthesis of chlorophyll. The experiment was conducted in a green-house in UFPE laboratory in the town of Capão do Leão/RS. We evaluated leaf discs of corn and soybean obtained from mature leaves of plants in vegetative stage. The factorial arrangement 3x4 was used, where the first factor was the type of herbicide (bentazon, clomazone and fomesafen) and the other factor was the concentration of the herbicide (0 μM, 100 μM, 250 μM and 500 μM). There were two distinct experiments, with 15 and 5 replicates per treatment. In the first experiment (n=15), the effects of herbicides on the transient chlorophyll a fluorescence was measured using a portable fluorometer (HandyPEA, Hansatech). In the second experiment (n=5), we evaluated the effect of herbicides on modulated chlorophyll a fluorescence (relaxation kinetics and light curves). Gas exchange was studied using the parameters determined by the portable infra-red CO₂ analyzer (model IRGA LI 6400XT, LI-COR). The intensity of chlorophyll fluorescence and the other parameters were most strongly affected by the herbicide bentazon. The herbicides clomazone and fomesafen caused relatively small changes in the transient fluorescence data, whereas the modulated fluorescence parameters and gas exchange were more sensitive to clomazone and fomesafen action. The desenhamento indexes and PI_{ABS} $PI_{ABS\ total}$ were the transient fluorescence parameters most sensitive to the action of the three herbicides. For the modulated fluorescence, F_S , F_M' , ETR and ϕ_{PSII} were the most sensitive parameters to the action of bentazon, clomazone and fomesafen. Corn leaves were less susceptible to the three herbicides than soybean leaves. Such difference might suggest that C₄ plants have the ability to better tolerate herbicides than species with only the C₃ metabolism.

Keywords: chlorophyll a fluorescence, JIP, PAM, gas exchange.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	09
2. MATERIAL E MÉTODOS	31
2.1. Instalação do experimento e aplicação dos tratamentos	31
2.2. Ensaio I: Efeito dos herbicidas sobre a fluorescência transiente	32
2.3. Ensaio II: Efeito dos herbicidas sobre a fluorescência modulada da clorofila <i>a</i> e trocas gasosa	35
2.3.1. Cinética de relaxamento de fluorescência	35
2.3.2. Curvas de fluorescência em resposta a luz	36
2.4. Delineamento experimental e análise estatística	37
3. RESULTADOS	38
3.1. Soja	38
3.1.1. Fluorescência transiente	38
3.1.1.1. Cinética de emissão de fluorescência transiente da clorofila <i>a</i>	38
3.1.1.2. Teste JIP	41
3.1.1.3. Análise de duplo flash	44
3.1.2. Fluorescência modulada	46
3.1.2.1. Análise da cinética de relaxamento	46
3.1.2.2. Análise de curva de intensidade luminosa vs parâmetros de PAM	53
3.1.3. Trocas gasosas	60
3.2. Milho	65
3.2.1. Fluorescência transiente	65
3.2.1.1. Cinética de emissão de fluorescência transiente da clorofila <i>a</i>	65
3.2.1.2. Teste JIP	67
3.2.1.3. Análise de duplo flash	70
3.2.2. Fluorescência modulada	72
3.2.2.1. Análise da cinética de relaxamento	72
3.2.2.2. Análise de curva de intensidade luminosa vs parâmetros de PAM	78
3.2.3. Trocas gasosas	84
4. DISCUSSÃO	89
5. CONCLUSÃO	100
6. REFERÊNCIAS	101

1. INTRODUÇÃO

A fotossíntese é o processo fisiológico fundamental do metabolismo das plantas, sendo responsável pelo crescimento e produtividade das culturas, podendo ser fortemente afetada por estresses ambientais. É um processo pelo qual as plantas convertem a energia luminosa em energia química (ATP e NADPH), utilizados para a síntese de carboidratos, essenciais para a manutenção dos vegetais. O processo fotossintético ocorre nos cloroplastos e compreende duas etapas interdependentes e simultâneas, a fase fotoquímica (reações de absorção e conversão da energia luminosa que ocorrem nos tilacóides) e a fase bioquímica (reações de carboxilação que ocorrem no estroma).

Os cloroplastos são organelas com aproximadamente 5-10µm de diâmetro, preenchidos com matriz aquosa chamada de estroma, envolta por dupla camada de membrana (MUSTÁRDY; GARAB, 2003). No estroma existe um sistema de membrana contínua, conhecido como membranas dos tilacóides. Estas membranas são organizadas em grana (empilhadas) e interligadas pelas lamelas do estroma (desempilhadas) (Fig. 1). As membranas dos tilacóides são preenchidas por uma fase aquosa interior, denominada de lúmen.

Figura 1. Micrografia eletrônica de um cloroplasto. (URL: <http://www.uic.edu/classes/bios/bios100/lecturesf04am/lect10.htm>)

As clorofilas são pigmentos de extrema importância presentes nos cloroplastos, que têm a função de absorver a energia luminosa. São moléculas tetrapirrólicas com um íon magnésio ao centro, esterificadas com um radical fitol (STREIT et al., 2005). Embora elas executem suas funções com alta eficiência, nem toda a energia de radiação absorvida segue para a efeito fotoquímico, o excesso pode ser dissipado na forma de calor (cerca de 18% do total da luz absorvida pelas plantas) ou re-emitido como fluorescência (1-2%) (KRAUSE; WEIS, 1991) (Fig.2). A fração de radiação absorvida e dissipada varia de acordo com o estado metabólico, e fornece a base para o entendimento dos processos fotossintéticos. Os três processos ocorrem em competição direta, de maneira que qualquer aumento da eficiência de um irá causar um decréscimo no rendimento dos outros, mas em condições fisiológicas normais o processo que apresenta maior rendimento é a reação fotoquímica da fotossíntese, que ocorre dentro do centro de reação do fotossistema II (FSII) (BUONASERA et al., 2011).

Figura 2. Destino da energia absorvida a partir da radiação solar. A maioria da energia (cerca de 80%) é convertida no processo fotoquímico da fotossíntese, enquanto que a energia restante é dissipada na forma de calor (cerca de 18%) ou re-emitida como fluorescência (1-2%). (Adaptado de: BUONASERA et al., 2011).

Na etapa fotoquímica da fotossíntese a energia luminosa é absorvida pelas clorofilas presentes nos fotossistemas e em conjunto com os demais componentes da cadeia de transporte de elétrons da fotossíntese é convertida em energia química. O fotossistema II (FSII) é um supercomplexo protéico com múltiplas subunidades. Funcionalmente, pode ser descrito em três domínios estruturais principais: (1) o núcleo de reação transmembrana que consiste

num heterodímero composto de duas proteínas D_1 e D_2 , que são centralmente envolvidas na ligação do complexo fotooxidável clorofila P_{680} , e proporcionam a maior parte das ligações dos cofatores com o complexo Mn_4Ca , que formam o complexo de evolução do oxigênio (CEO), local de oxidação da água (LOLL et al., 2005); (2) o complexo de clorofilas do FSII representado pelas antenas interiores e periféricas e (3) o conjunto de proteínas extrínsecas, que incluem três subunidades de membrana que são PsbO, PsbP e PsbQ (KERN; GUSKOV, 2011), e estão intimamente associados ao CEO, estando localizadas no lado do lúmen do tilacóide.

No complexo de clorofilas as antenas interiores consistem em proteínas de ligação, chamadas CP47 e CP43, formadas por seis hélices transmembranares e 14 e 16 moléculas de clorofila *a*, respectivamente. Enquanto, as antenas periféricas - LHCII - transferem energia para a antena interior, que transfere a energia para o centro de reação, sendo formada por três hélices transmembranares hidrofóbicas e uma hélice anfipática exposta à superfície luminal da membrana, coordenando sete clorofilas *a*, cinco clorofilas *b*, e três ou quatro moléculas de carotenóides (luteína, neoxantina e violaxantina), sendo sua função principal absorver fótons e transportar a energia de excitação para o centro de reação do FSII - P_{680} (GUSKOV et al., 2009). Dessa forma a energia do fóton absorvido é transferida entre as clorofilas, até chegar a feofitina e assim iniciar a sequência de transporte de elétrons para as plastoquinonas Q_A e Q_B (WILLIANSO et al., 2011) (Fig. 3). Todos estes cofatores ligam-se às proteínas D_1 e D_2 que também apresentam um resíduo de tirosina e ferro não-heme (Fe^{2+}) (XIONG et al., 1996; ZHU et al. 2005). O núcleo de reação ainda apresenta uma membrana intrínseca, conhecida como citocromo *b559*, que é composta pelas subunidades PsbE e PsbF (KERN; GUSKOV, 2011).

Figura 3. Desenho esquemático da etapa fotoquímica da fotossíntese (Adaptado de: ALLAKHVERDIEV, 2011).

As reações no centro de reação do FSII iniciam com a excitação de P_{680} , que rapidamente perde um elétron para reduzir o aceptor primário – feofitina, que transfere o elétron de forma sequencial as plastoquinonas (Q_A e Q_B) que estão ligadas ao centro de reação (OKAMURA et al., 2000) (Fig.4A e 4B). Enquanto Q_A está fortemente ligada na membrana do tilacóide, Q_B é levemente ligada (GUO; TAN, 2011). Depois de receber dois elétrons, Q_B^{-2} vai se combinar com dois prótons do estroma para se tornar uma plastohidroquinona (PQH_2) (Fig.4C). A plastohidroquinona reduzida desacopla-se da proteína D1 e, por difusão, entra na porção hidrocarbonada da membrana, onde transfere os seus elétrons ao complexo citocromo b_6f (Cyt b_6f). A PQH_2 será oxidada pelo Cyt b_6f e a plastoquinina (PQ) resultante (Figura 4D) irá retornar para o conjunto de PQ (GOLTSEV; YORDANOV, 1997). O complexo Cyt b_6f é desprovido de pigmentos e catalisa a transferência de elétrons entre o FSII e o FSI.

Figura 4. Esquema das transferências de elétrons que ocorrem entre as quinonas FSII (Adaptado de: GUO; TAN, 2011).

O fotossistema I (FSI) é o outro complexo envolvido na fase fotoquímica da fotossíntese. Este complexo recebe elétrons provenientes do FSII, através da plastocianina (PC). Os componentes do centro de reação do FSI estão organizados ao redor de duas proteínas principais, PsaA e PsaB. Os elétrons são transferidos da PC para o P_{700} e daí para um monômero de clorofila (A_0), para uma filoquinona (A_1), para os centros Fe-S, e finalmente para a proteína ferro-sulfurosa hidrossolúvel ferredoxina (Fd) (TAIZ; ZEIGER, 2009). A flavoproteína associada à membrana, ferredoxina-NADP redutase (FRN), reduz o $NADP^+$ a NADPH, completando assim o transporte acíclico de elétrons (KARPLUS et al., 1991). Nem todos os elétrons que

chegam a ferredoxina resultam na formação de NADPH, rotas alternativas podem ser tomadas dependendo da necessidade do vegetal. Os elétrons oriundos da ferredoxina reduzida, que é produzida pelo FSI, interagem com várias enzimas ferredoxina-dependente não apenas nas assimilações de nitrogênio inorgânico, enxofre e fixação de N_2 , mas também na regulação do ciclo de assimilação de CO_2 (FUKUYAMA, 2004).

Adicional ao fluxo acíclico de elétrons, onde os elétrons da ferredoxina são transferidos para o $NADP^+$, resultando na acumulação de NADPH, existem outros dois tipos de fluxo de elétrons que podem ocorrer na fase fotoquímica da fotossíntese, o fluxo cíclico e o pseudocíclico. O fluxo cíclico ou fosforilação cíclica depende apenas da reação fotoquímica do FSI (MUNEKAGE; SHIKANAI, 2005), pois os seus elétrons são reciclados a partir da ferredoxina à plastoquinona, gerando um gradiente de prótons através da membrana do tilacóide, que resulta na produção de ATP, sem acumular NADPH (SHIKANAI, 2007). Neste processo, os elétrons circulam indefinidamente ao redor do FSI. O fluxo de elétrons pseudocíclico ocorre em certas condições fisiológicas quando o O_2 recebe os elétrons oriundos da ferredoxina no lugar do $NADP^+$, através de uma reação não-enzimática (FRIDLAND; SCHEIBE, 1999). Esta reação foi descrita por Mehler (1951), e por esta razão, é conhecida como reação de Mehler. Esta reação pode ter um importante papel na proteção dos vegetais sob condições de estresse (HAUPTHERTING; FOCK, 2002).

O poder redutor gerado através da fase fotoquímica, NADPH, bem como, a energia disponível a partir da hidrólise de ATP, são críticos para a produção de carboidratos a partir de CO_2 , que ocorre na fase bioquímica (STIRBET; GOVINDJEE, 2011). Esta etapa ocorre no estroma dos cloroplastos, num processo denominado de ciclo de Calvin-Benson, tendo a Rubisco (ribulose-1,5-bisfosfato carboxilase/oxigenase) como enzima-chave na assimilação fotossintética de CO_2 (BASSHAM, 2003).

A eficiência de conversão de energia dos fótons para NADPH e ATP é elevada quando a assimilação líquida de CO_2 é limitada pelo fornecimento de fótons, neste caso, o rendimento quântico ou eficiência fotoquímica do FSII (ϕ_{FSII}) é alto (MIYAKE et al., 2005). No entanto, quando a assimilação líquida de CO_2 é limitada pela reação de carboxilação da ribulose-1,5-bisfosfato (RuBP) catalisada pela Rubisco, a sua eficiência é baixa. Como resultado, ϕ_{FSII} diminui e a energia dos

fótons absorvidos é apenas parcialmente utilizada para assimilação de CO_2 (MIYAKE et al., 2005). Nestes casos, o excesso de energia no FSII pode causar danos nas membranas dos tilacóides, estimulando a produção de espécies reativas de oxigênio (NIYOGI, 2000). O parâmetro ϕ_{FSII} pode ser usado para calcular a taxa de transferência de elétrons linear (ETR) (GENTY et al., 1989)

Quando a quantidade de energia produzida pelo excesso de luz excede a capacidade de transporte de elétrons por vias disponíveis, outros mecanismos de deexcitação tornam-se importantes. Inicialmente ocorre a produção de clorofila "triplet" (^3Chl), que pode reagir com oxigênio molecular produzindo oxigênio "singlet" ($^3\text{O}_2$), uma espécie muito reativa e nociva para os vegetais (BARBER, 2001). O dano inclui a oxidação de lípidos, proteínas e pigmentos (FORMAGGIO et al., 2001), levando a fotoinibição do aparato fotossintético. No entanto, os complexos do FSII e FSI possuem pigmentos responsáveis pela proteção contra danos, denominados carotenóides. Estes carotenóides são isoprenóides que podem agir de duas maneiras: (I) por extinção de clorofilas "triplets" ou (II) por eliminar diretamente o oxigênio "singlet"; em ambos os casos os "triplets" de carotenóides que são formados voltam para o estado fundamental, produzindo calor (KRIGER-LIZKAY et al., 2008). Para estes processos ocorrerem, clorofilas e carotenóides precisam estar extremamente próximos porque elétrons são transferidos das clorofilas aos carotenóides através de um mecanismo de troca de Dexter (a transferência de elétrons é facilitada quando os núcleos dos complexos estiverem em uma determinada posição que torna iguais a energia dos elétrons dos sistemas) (SIEFERMANN-HARMS, 1985). As distâncias entre os pigmentos muito curtas são mantidas pelas proteínas, que coordenam os pigmentos, permitindo assim que a transferência de energia seja rápida e eficiente na fotoproteção (MOZZO et al., 2008).

A composição de carotenóides de plantas superiores é altamente conservada. As subunidades do FSII e FSI codificadas no cloroplasto se ligam a β -caroteno, enquanto a antena externa, composta por complexos codificados no núcleo (LHC), apresentam luteína, neoxantina, e violaxantina à luz moderada, e zeaxantina (MOZZO et al., 2008) através da epoxidação de violaxantina sob condições de estresse de luz (GOSS; JAKOB, 2010).

A extensão da fotoinativação do FSII depende diretamente do estado redox de Q_A (MELIS, 1999) e indiretamente do nível de dissipação de energia térmica (NIYOGI, 1999) nos complexos de FSII. O estado redox de Q_A e o nível de dissipação

de energia térmica são tradicionalmente estimados utilizando-se os coeficientes de extinção fotoquímicos (q_P) e não-fotoquímicos (NPQ) de fluorescência, respectivamente (MAXWELL; JOHNSON, 2000; MÜLLER et al., 2001; ROHÁČEK, 2002, 2010).

O NPQ é um índice que demonstra claramente o processo fotoprotetor de excitação de estados “singlets” na antena do FSII (LAVAUD, 2007). Tem sido demonstrado que NPQ é de fato essencial tanto para o crescimento ótimo, como para a sobrevivência das plantas sob condições naturais (KÜLHEIM et al., 2002) e é induzido por baixas ϕ_{FSII} (MIYAKE et al., 2004; MIYAKE et al., 2005). A indução de NPQ requer um gradiente de pH através das membranas dos tilacóides. A acidificação do lúmen dos tilacóides é impulsionada pelo fluxo de elétrons cíclico em torno do FSI (MIYAKE et al., 2005). O fluxo cíclico de elétrons aumenta em condições de saturação de luz e/ou redução da pressão parcial de CO_2 e está positivamente correlacionado com o NPQ (MIYAKE et al., 2004). Os mecanismos de indução não-fotoquímico foram classificados em três classes: 1) os de extinção dependente de energia - q_E , um componente rapidamente reversível causado pela ΔpH através da membrana tilacóide; 2) os de extinção dependentes do estado de transição - q_T ; e 3) os de extinção dependentes da fotoinibição - q_I (KRAUSE; WEIS, 1991). Todos estes processos têm papéis fisiológicos que contribuem para a proteção do aparelho fotossintético.

Uma maneira comum para caracterizar a operação de processos fotoprotetores ou a susceptibilidade à fotoinibição é quantificar a resposta à luz do NPQ. Isto é feito através da construção de curvas NPQ, “versus” a radiância fotossinteticamente ativa (RFA) que registram o desenvolvimento de NPQ quando a radiação incidente aumenta. Estas curvas são análogas às curvas de luz em função da taxa de transporte de elétrons (ETR) frequentemente medidas, no sentido de que elas representam a variação do estado estacionário da atividade fotossintética entre os diferentes níveis de luz, portanto, não informando sobre a cinética da geração NPQ, mas sim o nível de NPQ atingível em cada irradiância (MINAGAWA, 2008). A forma da curva de NPQ “versus” RFA varia amplamente, em relação tanto a sua forma geral quanto aos valores absolutos de NPQ alcançadas. Normalmente, NPQ aumenta monotonicamente com a irradiância, variando de zero (no escuro), para valores máximos, que variam muito com os

grupos taxonômicos, estado fisiológico, restrições ambientais ou níveis de luz aplicados.

O estudo de processos de dissipação de energia é complicado pelo fato de pesquisadores utilizarem termos diferentes para não-fotoquímico, por exemplo os parâmetros NPQ "versus" q_N . Diferentemente de NPQ, que apresenta uma escala de zero a infinito (MINAGAWA, 2008), o parâmetro q_N requer uma medição de F_0 e cai sobre uma escala de 0-1 sendo, portanto, relativamente insensível a variações de extinção a valores mais elevados (KOOTEN; SNEL, 1990).

Já o parâmetro q_P representa a extinção causada pelo processo fotoquímico, ou seja, aquela causada pela utilização da energia para a redução do NADP^+ . Ele indica a proporção de centros de reação abertos no FSII (MINAGAWA, 2008), estando diretamente relacionado com o estado redox de Q_A , e decresce na proporção do fechamento dos centros de reação (redução de Q_A). Quando a etapa fotoquímica é bloqueada devido à redução de Q_A , ($q_P = 0$) o rendimento de fluorescência é máximo. Quando todos os centros de reação são capazes de realizar fotoquímica, ou seja, quando todas as Q_A encontram-se oxidadas, q_P é máximo (= 1) e o rendimento de fluorescência é baixo (TING; OWENS, 1992).

Todos estes processos competem entre si e contribuem para a redução de clorofilas no estado "triplet". Portanto, um aumento na taxa de um desses processos, diminui o rendimento da fluorescência (ϕ_F) (SERÔDIO; LAVAUD, 2011). Historicamente, o termo "extinção" refere-se a todos os processos que reduzem ϕ_F . O rendimento da fluorescência, variando no tempo, permite a investigação dos mecanismos através dos quais a energia da luz absorvida em complexos do FSII é utilizada na fotossíntese. De acordo com a lei da conservação de energia, o aumento da eficiência dos processos fotoquímicos conduz à diminuição da eficiência dos processos não-fotoquímicos, em que a energia de excitação é redistribuída, e vice-versa. Interpretação da extinção da fluorescência da clorofila depende da capacidade de resolver contribuições de muitos fatores que conduzem à redução do ϕ_F (GENTY et al., 1989; ZHU et al., 2005).

A avaliação de fluorescência permite a medição da fração de radiação absorvida fotossinteticamente e não utilizada na fase fotoquímica pelo centro de reação e, portanto, é geralmente considerada como uma medida inversa da atividade do estado funcional do processo fotossintético (BUONASERA et al., 2011). Inicialmente acreditava-se que por causa das diferentes propriedades de doadores

de elétrons primários e da organização de receptores de elétrons nos centros de reação, o FSII seria muito mais propenso do que a FSI para reemitir parte da energia absorvida como luz. Entretanto, pesquisas atuais já buscam informações sobre a fluorescência emitida pelo FSI.

Os estudos de fluorescência se iniciaram através de observações realizadas por Kautsky e Hirsch (1931), onde eles constataram que em uma transição de escuro para a luz a intensidade de fluorescência inicialmente aumenta, seguida por um declínio até chegar a um nível constante (Fig. 5). Os avanços tecnológicos nos últimos 80 anos permitem, hoje, medir este fenômeno com muito mais detalhe e com uma resolução de tempo muito maior. As reações de fotossíntese ocorrem no FSII durante uma grande faixa de tempo. Reações que duram até centenas de picossegundos são consideradas "ultrarápidas" (LAIBLE et al, 1994). As reações que duram de dezenas de microssegundos até dezenas de milissegundos são consideradas "rápidas", e aqui se encontram aquelas que ocorrem no lado aceptor do FSII, como as que incluem a partilha de elétrons entre as quinonas primárias e secundárias e as reações subsequentes que resultam na redução dos transportadores de elétrons do sistema. Por último, as reações dependentes da energia de extinção, transições de estado, e fotoinibição são consideradas "lentas" e a sua duração vai de segundos a centenas de minutos (MINAGAWA, 2008). Diferentes técnicas têm sido aplicadas para a elucidação das reações em domínios de tempo diferentes.

Figura 5. Cinética de emissão da fluorescência ou curva de Kautsky. (a) cinética rápida (escala logarítmica); (b) cinética lenta (escala logarítmica) e (c) curva em escala de tempo linear (até 120s) (Adaptado de: STRASSER et al., 2004).

O estudo da fluorescência da clorofila *a*, é um método simples, rápido e não invasivo, que fornece dados precisos sobre a eficiência fotoquímica e efeitos adversos nas plantas expostas a condições de estresse e tem sido utilizado com sucesso para monitorar mudanças no estado fisiológico do sistema fotossintético. Embora a fluorescência corresponda a uma fração muito pequena da energia dissipada a partir do aparato fotossintético, é uma técnica amplamente aceita e utilizada para fornecer informações sobre os complexos de pigmentos, sua organização, a transferência de energia de excitação entre eles, e sobre as diversas reações de transferência de elétrons específicas do FSII (PAPAGEORGIU; GOVINDJEE, 2011; STIRBET; GOVINDJEE, 2011).

Nos estudos de fluorescência transiente dois níveis são de extrema importância são definidos como se segue: F_0 (rendimento mínimo de fluorescência) é o nível de fluorescência da clorofila quando todos os centros de FSII estão abertos e F_M (rendimento máximo de fluorescência) é o nível máximo de fluorescência da clorofila quando todos os centros de reação do FSII estão fechados (MINAGAWA, 2008) (Fig. 6). Na prática, o valor mínimo de F_0 é conseguido através da adaptação ao escuro da amostra, o que permite a abertura de todos os centros de reação do FSII. A fluorescência máxima, F_M , é obtida por um pulso de luz saturante (STRASSER; STIRBET, 2001; STRASSER et al., 2004). A diferença entre a fluorescência proveniente de centros de reação fechados e abertos é chamada de fluorescência variável, ou F_V ($F_V = F_M - F_0$), e é uma medida relativa dos centros de reação fotoquimicamente ativos (MINAGAWA, 2008). A ϕ_{FSII} é calculada em amostras adaptadas ao escuro e é definida pela relação F_V/F_M . Este parâmetro é o mais frequentemente referido na literatura e seu declínio indica perda de eficiência fotoquímica, que é, por sua vez, sintomático do efeito de vários estresses ambientais (FARALONI et al., 2011; KALAJI et al., 2011). Entretanto, diversos autores verificaram insensibilidade de F_V/F_M em plantas expostas a estresses ambientais, como desbalanço nutricional (ADAMSKI et al., 2011), excesso de luz (GONÇALVES et al., 2010), salinidade (MEHTA et al., 2010) e estresse hídrico (CATALAYUD et al., 2006; MARTINAZZO et al., 2011; PERBONI et al., 2012).

A cinética da fluorescência da clorofila *a* permite o cálculo de parâmetros de fluorescência que caracterizam o funcionamento do aparelho fotossintético (YUSUF

et al., 2010). Os fluorômetros utilizados são de dois tipos básicos, fluorescência induzida por sinais contínuos, e por excitação modulada. Existem grandes debates sobre as vantagens e desvantagens das duas técnicas. No entanto, como ambos verificam o sinal de fluorescência emitida pelo aparato fotossintético, às informações obtidas a partir dos dois métodos não podem ser contraditórias (STRASSER et al., 2004). O que é realmente importante é fazer as ligações entre o sinal de fluorescência e a biofísica do sistema, para se obter as informações desejadas.

Figura 6. Representação esquemática mostrando a transferência de energia de excitação (pequenas setas vermelhas) de uma molécula de clorofila para outra em um sistema antena "genérico". Os discos verdes representam clorofilas *a* e *b*, e os discos amarelos os carotenóides; o disco verde mais escuro no meio do painel (a) representa um centro de reação aberto e o disco verde mais claro no meio do painel (b) representa um centro de reação fechado (Adaptado de: GOVINDJEE et al., 2010).

Nas medições de fluorescência com Pulso de Amplitude Modulado (PAM) (SCHREIBER et al., 1996), as equações foram derivadas à partir da distinção e quantificação dos dois tipos de extinção de fluorescência (ROHÁČEK, 2002), o coeficiente de extinção fotoquímico (q_P) e o não-fotoquímico (q_N e NPQ) (JUNEAU et al., 2005).

Esta técnica permite a separação dos eventos fotoquímicos e não-fotoquímicos de extinção de fluorescência por utilização de pulsos de luz saturantes, sobrepostos à irradiação actínica contínua (BUONASERA, 2011). Nestas avaliações, os cinco principais níveis de intensidade de fluorescência são obtidos: F_0 , F_0' , F_M , F_M' e F_s . F_0 e F_M são o rendimento mínimo e máximo de fluorescência como descrito anteriormente. F_0' e F_M' são a intensidade mínima e máxima de fluorescência efetiva, obtidas sem prévia adaptação da planta ao escuro e F_s é o valor de estado

estacionário de fluorescência atingido durante a cinética de indução de luz (GORBE; CATALAYUD, 2012). A partir destes valores de fluorescência, os outros parâmetros podem ser calculados como o coeficiente de extinção fotoquímico (qP), o não-fotoquímico (qN e NPQ) (SCHREIBER et al., 1996; SCHREIBER; KLUGHAMMER, 2008) e o rendimento quântico efetivo do FSII (ϕ'_M) ou F_V'/F_M' , que representa a capacidade da planta para converter energia do fóton em energia química, uma vez alcançado o “steady-state” (equilíbrio dinâmico) de transporte de elétrons (GENTY et al., 1989). Isto é possível, pois usando este sistema, o rendimento de fluorescência pode ser medido, mesmo na presença de luz solar. Parâmetros de extinção de fluorescências são comumente empregados para avaliar a eficiência fotossintética das plantas expostas a poluentes ou outros estresses ambientais (JUNEAU et al., 2003). No entanto, alguns parâmetros parecem ser mais sensíveis do que outros a estes estresses. Por exemplo, ϕ'_M e qN foram em vários casos, muito mais sensíveis em uma série de indicadores de resposta ao estresse do que qP , como observado em plantas expostas a alguns herbicidas (FRANKART et al., 2003).

Nas avaliações da cinética de emissão da fluorescência transiente ou polifásica, pode-se observar que após as plantas serem expostas a um período suficientemente longo de escuro (15-30 min até uma hora), os dados originais de cinética de indução de fluorescências são observados novamente quando a mesma intensidade de luz é ligada. Esta curva tem pontos de inflexão (STRASSER et al., 2004): a fase rápida é rotulada como OJIP, onde O é para a origem, J e I são níveis (passos) intermediários, e P é o pico máximo. A fase lenta é chamada PSMT (PAPAGEORGIOU; GOVINDJEE, 1968), onde S representa o estado semi-estacionário, M para um máximo, e T para um nível de estado terminal constante (Fig. 05).

Alterações de fluorescência durante a parte rápida do transiente (isto é, até quando o rendimento da fluorescência atinge o pico P) podem ser correlacionadas com os eventos que ocorrem nas reduções sucessivas dos aceptores de elétrons da cadeia de transporte de elétrons fotossintética (PAPAGEORGIOU; GOVINDJEE, 2004). A parte lenta é mais difícil de interpretar, pois ocorre um aumento do número de processos envolvidos durante esta fase, como por exemplo, extinção de fluorescência não-fotoquímica, síntese de ATP, ciclo de Calvin, entre outros (STIRBET; GOVINDJEE, 2011).

Estas avaliações da cinética de emissão da fluorescência transiente ou polifásica podem ser descritas utilizando-se o Teste JIP (STRASSER; STRASSER, 1995; STRASSER et al., 2000), o qual quantifica o fluxo de energia que passa pelos fotossistemas e avalia o desempenho fotossintético de plantas. O teste JIP, fornece informações adequadas sobre a conformação, estrutura e função do aparato fotossintético em qualquer estado fisiológico, podendo ser utilizado para estudar ponto a ponto as mudanças no comportamento deste aparato, através das alterações dos parâmetros obtidos (STIRBET; GOVINDJEE, 2011). A derivação das ligações entre a biofísica do aparato fotossintético e os sinais de fluorescência, e sua formulação analítica é baseada na “Teoria dos Fluxos de Energia em Biomembranas” (STRASSER, 1978) e no conceito de que o rendimento de fluorescência do FSII é determinado pelo estado, aberto ou fechado, do centro de reação. As alterações dinâmicas do estado de fechamento do FSII induzidas por radiação saturante conduzem a um aumento rápido do rendimento de fluorescência que é visto como um transiente OJIP polifásico (STRASSER; GOVINDJEE, 1992). Atualmente, sabe-se que quando Q_A é reduzida, o centro de reação do FSII (CRII) é fechado e a fluorescência da clorofila *a* é alta, enquanto que, quando Q_A está no estado oxidado, o CRII está aberto e a fluorescência é muito baixa (STRASSER et al., 2004).

Além dos CRs abertos e fechados, também é importante destacar o papel dos centros de reação silenciados, ou seja, aqueles que não reduzem Q_A . Isto ocorre, devido a existência de locais não-redutores de Q_B , pois alguns sítios de Q_B não podem aceitar elétrons de Q_A (GUO; TAN, 2011). Os centros de reação do FSII são considerados homogêneos no modelo simples usado para se obter o transiente OJIP, mas sabemos que “in vivo”, há vários tipos de heterogeneidades no FSII, tais como o tamanho diferente das antenas e Q_A ou Q_B inativos (MELIS, 1985). A exposição a diferentes estresses abióticos afeta essas heterogeneidades, alterando as frações de diferentes centros do FSII. A fluorescência das clorofilas do FSII com locais não-redutores de Q_B tem uma dinâmica diferente daquela em que os FSII possuem sítios redutores de Q_B (STIRBET; GOVINDJEE, 2011). Os centros não-redutores de Q_B são conhecidos por terem uma influência específica sobre o transiente de fluorescência, especialmente na parte OJ, que tem sido mantido por meio de simulação numérica (STRASSER; STIRBET, 1998). Um teste rápido para a avaliação da fração não-redutora de Q_B no FSII foi proposto por Strasser e

colaboradores (STRASSER; TSIMILLI-MICHAEL, 1998), com base no fato de estes centros apresentarem uma cinética de relaxamento lento no escuro. Uma maneira fácil para detectar estes CRs silenciados é a indução de dois pulsos de luz subsequentes (cada um com 1s de duração) separados por um curto intervalo de relaxamento – escuro (no máximo 500ms) (STRASSER et al., 1992). O primeiro pulso fornecido após o período de adaptação ao escuro é suficiente para garantir a reabertura de todos os CRs, e induz uma fluorescência transiente; um segundo pulso segue, induzindo uma fluorescência transiente, chamada de O^{*}-J^{*}-I^{*}-P^{*} (Fig.7). O intervalo escuro entre os dois pulsos é suficientemente curto para permitir somente a reabertura dos CRs redutores de Q_B. Aqueles CRs que se mantêm fechados dentro de aproximadamente 500ms são considerados como não-redutores de Q_B (STRASSER et al., 2004).

Figura 7. Curva de indução de fluorescência da clorofila *a* obtida através de dois pulsos saturantes, com intervalo de 500 ms entre cada pulso. O 1º pulso foi emitido após a adaptação da folha a 30 min de escuro (Adaptado de: MEHTA et al., 2011).

O Teste JIP envolve duas formas diferentes de processamento de dados, que permitem analisar sinais de fluorescência específicos ou as curvas como um todo (YUSUF et al, 2010). No primeiro tipo, são obtidos parâmetros que caracterizam a amostra fotossintética baseados principalmente nas estimativas de fluxos de energia por centro de reação ou por seção transversal (área) da amostra, nas taxas de fluxos de energia, e em outras expressões matemáticas envolvendo os fluxos de energia. Estes parâmetros são calculados usando os valores específicos de fluorescência a partir dos transientes OJIP obtidos, com base em um número de

hipóteses sobre o aparelho fotossintético e a sua função, tais como a conversão de energia de excitação e as etapas de transferência de elétrons nos dois sistemas fotossintéticos (STIRBET;GOVINDJEE,2011).Dentre os parâmetros que são derivados a partir deste teste encontram-se os que quantificam o fluxo de energia através do centro de reação (CR) do FSII(ABS/RC , TR_0/RC , ET_0/RC , DI_0/RC e RE_0/RC), os fluxos baseados na área da amostra excitada (CS) (ABS/CS_0 , TR_0/CS_0 , ET_0/CS_0 e DI_0/CS_0), os rendimentos energéticos (ϕP_0 , ϕE_0 , ϕD_0 e ϕR_0) e as eficiências (ψ_0 , ρ_0 e δ_0). (STRASSER; STRASSER, 1995; FORCE et al., 2003; STRASSER et al., 2004) (Fig. 8).Todos esses fluxos de energia estão interligados e são dependentes de propriedades estruturais e atividade fotossintética da amostra biológica.

Figura 8. Esquema simplificado da cascata de energia a partir da absorção de luz para o transporte de elétrons (Adaptado de: STRASSER et al., 2004).

Nas avaliações da fluorescência transiente completa, o que é avaliado é a curva OJIP. No caso de plantas adaptadas ao escuro, no início da iluminação, é possível observar o início desta curva, ou seja, o passo "O", o qual representa a fluorescência mínima, isto é, quando todas as Q_A estão oxidadas. Em seguida, após a emissão de um pulso saturante (por exemplo, $3.000 \text{ mmol f\u00f3tons m}^{-2}\text{s}^{-1}$), ocorre um rápido aumento da fluorescência, passo denominado de "P" ou " F_M " (fluorescência máxima - todas as Q_A encontram-se reduzidas) em $\sim 200 \text{ ms}$ (YUSUF et al., 2010). Além disso, outros dois passos intermediários podem ser detectados, o "I" e "J", situados respectivamente em $\sim 2 \text{ ms}$ e $\sim 30 \text{ ms}$ (T\u00d3TH et al., 2007).

A fase OJ da fluorescência transiente est\u00e1 relacionada com a redu\u00e7\u00e3o fotoqu\u00edmica do principal aceptor do FSII (Q_A), sendo a sua cin\u00e9tica fortemente

dependente da densidade de fluxo de luz (SCHANSKERetal., 2005). A fase OI da cinética, revela mudanças no processo entre o éxciton capturado pelos CRs até a redução da PQ (YUSUF et al., 2010). Na cinética da fase JI, são refletidas principalmente as reduções dos transportadores de elétrons do intersistema da cadeia de transporte de elétrons, ou seja, conjunto de plastoquinonas, Cyt_{b6}e PC, enquanto na fase IP são refletidas as reduções dos receptores de elétrons do lado aceptor do FSI, ou seja, ferredoxina (Fd), outros intermediários e NADP⁺ (SCHANSKERetal., 2005). No nível de F_M, todas as moléculas de Q_A são completamente reduzidas, devido à redução da cadeia de transporte de elétrons acíclica, como resultado de um atolamento de tráfego de elétrons no lado aceptor do FSI (SCHANSKERetal., 2005)

Alguns estudos recentes têm demonstrado que a fase de JI reflete a acumulação de Q_A⁻Q_B²⁻ quando a reoxidação do conjunto de plastoquinona através do Cyt_{b6} é máxima, enquanto que o aumento de fluorescência está relacionada com a acumulação do conjunto de plastoquinona reduzida, devido a uma diminuição de sua taxa de oxidação (JOLY; CARPENTIER, 2009). O nível de fluorescência no passo J é máximo quando todas as Q_A são reduzidas, que é o caso quando há concentrações saturantes de inibidores de FSI deslocando o elétron secundário do aceptor Q_B⁻, tais como os herbicidas fotossintéticos (BUKHOV et al., 2004). A correlação entre o centro de reação do FSI fechado e a alteração do pico J (na maioria das vezes expressa como variável relativa de fluorescência $V_J = (F_J - F_0)/(F_M - F_0)$, com o significado da quantidade relativa de Q_A reduzida $[Q_A^-]/[Q_A^- + Q_A]$) é amplamente utilizado com o objetivo de detectar e estimar a força de um inibidor (CHALIFOUR et al., 2009). O aumento de fluorescência rápida OP parece ser uma ferramenta essencial para estudar a atividade e a integridade do aparato fotossintético sob diferentes condições de estresse, sendo muito sensível a quaisquer mudanças nas reações de transferência de elétrons do lado aceptor do FSI (STRASSER et al., 1995).

Para comparar as amostras obtidas nas análises de transientes, é necessário normalizar os dados para fluorescência variável relativa (W): $W_{OJ} = (F_t - F_0)/(F_J - F_0)$, $W_{OI} = (F_t - F_0)/(F_I - F_0)$ and $W_{IP} = (F_t - F_I)/(F_P - F_I)$, e realizar a subtração da cinética como $\Delta W = W_{tratamento} - W_{controle}$ (YUSUF et al., 2010). Estas subtrações da cinética revelam bandas que geralmente são escondidas entre as etapas O, J, I e P dos transientes primários (STRASSER et al., 2004). A diferença cinética ΔW_{OJ} revela a banda "K" (a cerca de 300ms), enquanto que a ΔW_{OK} revela a banda "L" (em cerca de

150ms). A banda -K, está relacionada com a dissociação do complexo de evolução do oxigênio (DERONDE et al., 2004), ou, quando positiva, reflete a inativação deste complexo e/ou um aumento do tamanho da antena do FSII (YUSUF et al., 2010). Enquanto, a presença da banda -L é um indicador da conectividade energética ou do grau de agrupamento das unidades do FSII, sendo mais alta quando a conectividade é menor (STRASSER; STIRBET et al., 1998). Contudo, quanto menor a conectividade, menor a utilização da energia de excitação e menor a estabilidade do sistema (STRASSER et al., 2004). Oukarroum et al. (2007) sugerem que as bandas -K e -L são indicadores potenciais de estresse podendo ser consideradas como indicadores de distúrbios fisiológicos antes do aparecimento de sinais visíveis de estresse.

Além das análises de fluorescência das clorofilas *a*, as medições das trocas gasosas têm sido amplamente utilizados para parametrizar a fotossíntese de folhas. Estas análises só foram permitidas a partir do modelo de fotossíntese introduzido por Farquhar et al. (1980). Estas análises têm-se revelado úteis para ajudar a prever os efeitos da mudança climática sobre a fotossíntese (SABATÉ et al., 2002), e para avaliar a influência de diversos estresses (WILSON et al., 2000; SCHULTZ, 2003; WARREN, 2004) sobre a capacidade fotossintética.

Outro fator que deve ser levado em consideração quando se estuda a fotossíntese, é o tipo de metabolismo fotossintético que as plantas apresentam. Desde a descoberta das plantas C_4 na década de 1960, quantidades significativas de pesquisas têm sido realizadas para estudar a bioquímica e genética da fotossíntese C_4 . A principal diferença entre a fotossíntese C_3 e C_4 é que a fotossíntese C_4 tem um mecanismo de concentração de CO_2 , que aumenta a concentração deste ao redor da enzima Rubisco, correspondentemente, reduz a fotorrespiração e aumenta a taxa de fixação líquida de CO_2 (SAGE, 2004). O mecanismo de concentração de CO_2 depende da cooperação de dois tipos de células especializadas, as células da bainha e as do mesófilo.

Nas células da bainha, a concentração da Rubisco é alta, enquanto que nas células do mesófilo, a concentração de PEP carboxilase (PEPcase) é elevada (SAGE, 2004). Além das diferenças bioquímicas entre estes dois tipos de células, as plantas C_4 também possuem um sistema de transporte eficiente dos metabólitos entre estes dois tipos de células (LEEGOOD, 2002), e a parede celular das células da bainha é mais espessa para formar uma estrutura denominada de "estrutura

Kranz”. Nas células do mesófilo das plantas C_4 acontece a fixação do CO_2 , pela PEPcase, que fixa o CO_2 (HCO_3^-) produzindo oxaloacetato, um composto de quatrocarbonos, a partir do fosfoenolpiruvato (3C) diferentemente da Rubisco, que forma trioses no Ciclo C_3 . O oxaloacetato é então convertido a malato ou aspartato, passa para as células da bainha, e é descarboxilado, formando piruvato e liberando CO_2 , que então é utilizado pela Rubisco para formar trioses no ciclo C_3 .

Nas plantas C_4 há uma separação espacial entre a fixação do CO_2 e a redução do composto intermediário de três carbonos, pois a PEPcase fixa o CO_2 nas células do mesófilo, e vai concentrá-lo nas células da bainha, onde ocorrerá a redução, no ciclo C_3 (FURBANK; HATCH,1987) (Fig. 9). Essas diferenças metabólicas existentes entre as plantas com metabolismo C_3 e C_4 , quando avaliadas, fornecem resultados importantes sobre a complexidade e as interações que existem entre a planta e o meio.

Figura 9. Metabolismo fotossintético C_4 . Diferença espacial entre assimilação e redução de CO_2 . (PEP = fosfoenolpiruvato; OAA = oxaloacetato; PDK = ortofosfato dicinase; PEPC = fosfoenolpiruvato carboxilase; NADP-MDH = malato desidrogenase; NADP-ME = enzima málica) (ZHU et al., 2010).

Ao longo dos anos, o estudo do comportamento do metabolismo dos vegetais vem sendo alvo de diversos grupos de pesquisadores, o que resultou em

descobertas importantes que auxiliaram o avanço da agricultura moderna. Desde a década de 50 foi introduzida como prática comum na agricultura a utilização de substâncias químicas capazes de matar ou suprimir o crescimento de espécies específicas de plantas, substâncias estas conhecidas como herbicidas (SENSEMANN, 2007).

Os herbicidas químicos apresentam propriedades eficazes que permitem penetrar na planta, serem translocados até o seu destino (sítio de ação) em uma dose letal. Uma grande maioria de herbicidas inibe enzimas e compete por sítios de ligação específicos que são essenciais para o metabolismo das plantas. Estas moléculas são classificadas por grupos químicos e de acordo com o seu mecanismo de ação. Atualmente existem 15 diferentes mecanismos de ação de herbicidas (HRAC, 2012), entre eles os mais utilizados são os inibidores: da enzima acetil-CoA carboxilase (ACCase), da enzima acetolactato sintase (ALS), da enzima 5-enolpiruvil-chiquimato-3-fosfato sintetase (EPSPs), do fotossistema II, da síntese de carotenóides e da síntese de clorofila.

Os herbicidas inibidores do FSII interrompem o fluxo de elétrons ligando-se a proteína D_1 , no sítio onde se acopla a PQ_B , competindo com a plastoquinona pelo sítio de ligação na proteína D_1 (ARMEL et al., 2007) (Fig. 10). Destacam-se como exemplo de herbicidas com este mecanismo de ação o diuron, o metribuzim, a atrazina e o bentazon. As plantas que sofrem a ação destes herbicidas têm a produção de carboidratos extremamente reduzida pelo drástico declínio da taxa fotossintética (POWLES; YU, 2010). Porém a morte das plantas não é resultado apenas desta redução, pois a energia continua sendo absorvida pelo centro de reação do FSII e não é utilizada para a transferência de elétrons na fotossíntese, o que resulta na formação de clorofila triplet, que leva à formação de espécies reativas de oxigênio (EROS) que causam danos as proteínas e membranas do vegetal (HUGIE et al., 2008).

Figura 10. Ação de herbicidas inibidores de FSII. Bloqueio do transporte de elétron de Q_A para Q_B (representado pelo X) (Adaptado de: BUCHANAN et al., 2000; GOVINDJEE et al., 2010).

Além dos herbicidas inibidores de FSII, outros dois mecanismos de ação herbicida estão envolvidos diretamente com a atividade fotossintética das plantas, os inibidores da síntese de carotenóides e da síntese de clorofila.

A biossíntese de clorofilas é realizada em diversas etapas, iniciando-se com o ácido glutâmico que passa por diversas etapas de síntese e conversão em compostos intermediários até a formação das clorofilas *a* e *b* (WETTSTEIN et al., 1995). Os herbicidas inibidores da síntese de clorofilas inibem a ação da enzima protoporfirinogênio IX oxidase (PROTOX) (POWLES; YU, 2010), que realiza a conversão do intermediário protoporfirinogênio IX em protoporfirina IX, etapa anterior a inserção do magnésio no processo de formação das clorofilas (BEALE; WEINSTEIN, 1990). Com a inibição da PROTOX a protoporfirinogênio IX acumulada sai dos cloroplastos para o citoplasma. No citoplasma esta molécula sofre uma oxidação enzimática formando protoporfirina IX, que no citoplasma não é utilizada como substrato para a enzima Mg-quelatase, que se localiza nos cloroplastos, responsável pela formação da Mg-protoporfirina IX (JACOBS; JACOBS, 1993). A protoporfirina IX formada no citoplasma, sem Mg, interage com o oxigênio e com a luz formando EROS que resultam na peroxidação dos lipídios da plasmalema (BECERRIL ; DUKE, 1989). Dentre os herbicidas inibidores da PROTOX encontram-se os grupos químicos difeniléteres, triazolinonas, ftamílicas e oxadiazóis (SENSEMAN, 2007).

Os carotenóides além da sua função como pigmentos acessórios, desempenham um papel essencial na fotoproteção dos vegetais (TRIANANTAPHYLIDÈS; HAVAUX, 2009). Esta fotoproteção pode ser vista como uma válvula de segurança que libera o excesso de energia absorvida pelos pigmentos, antes que este possa causar danos ao sistema. Em condições normais, a energia em excesso absorvida pelas clorofilas é dissipada através dos carotenóides (TAIZ; ZEIGER, 2009). Assim, quando os carotenóides não estão presentes, a clorofila que está no estado triplet não dissipa energia e inicia reações de degradação, nas quais ela é destruída, processo conhecido por fotoxidação (STREIT et al., 2005). Além disso, antes da fotoxidação das clorofilas, estas podem reagir com o oxigênio molecular, formando oxigênio “singlet”.

Herbicidas inibidores da síntese de carotenóides atuam em duas diferentes rotas de formação destes pigmentos, dependendo do seu grupo químico. Os herbicidas do grupo químico das isoxazolidinonas inibem a atividade da deoxixilulose fosfato sintase (DXP sintase), responsável pela síntese de isoterpenóides, precursores básicos dos carotenóides, numa rota alternativa, denominada rota metileritritol 4-fosfato (MEP), que ocorre no cloroplasto (FERHATOGLU; BARRET, 2006). Os demais grupos químicos (triketona, isoxazol e piridazinona) inibem a ação da enzima 4-hidroxifenil piruvato dioxigenase (4-HPPD), que realiza a conversão de 4-hidroxifenil piruvato em homogentisato, precursores da rota de formação de plastoquinona, que é cofator da enzima fitoeno desidrogenase, que participa da rota do mevalonato de formação de carotenóides, convertendo fitoeno em fitoflueno (MCCURDY et al., 2008).

A identificação da forma como as plantas se comportam na presença de herbicidas pode fornecer informações valiosas sobre o comportamento destas. Devido a isto, diversos estudos sobre o metabolismo dos vegetais estão sendo realizados utilizando herbicidas (CHEN et al., 2008; EULLAFFROY et al., 2009; SMIT et al., 2009). Diversos métodos vêm sendo empregados para o estudo de alterações no comportamento dos parâmetros fisiológicos de plantas expostas a estresses ambientais, inclusive os causados pela aplicação de herbicidas, como a análise da fluorescência da clorofila *a* e as medições das trocas gasosas. Muller et al. (2008), avaliaram a fluorescência da clorofila *a*, pelo método PAM, em algas expostas a herbicidas inibidores de FSII e observaram um declínio nos valores de F_M' e consequente aumento de NPQ destas plantas em relação ao controle.

Trabalhos envolvendo plantas de *Alternaria alternata* expostas a ácido tezuônico verificaram aumento da fase F-J, em valores próximos a F_M , mostrando quase uma fase de indução única em vez de um transiente com dois passos intermédios (J e I) (CHEN et al., 2008). Entretanto, estes mesmos autores, não encontraram alterações significativas nos valores de F_0 e F_M com o tempo de exposição das plantas ao ácido tezuônico. Catunda et al. (2005), obtiveram médias de rendimento quântico máximo do FSII (F_V/F_M) menores que as do controle, sugerindo redução no fluxo de elétrons, em plantas de abacaxi expostas a mistura de herbicidas inibidores de FSII e FSI.

Baseado no exposto, o objetivo deste trabalho foi estudar os parâmetros fisiológicos relacionados à fotossíntese por meio de análises da fluorescência da clorofila a transiente e modulada, e das trocas gasosas de discos foliares de plantas com metabolismo C_3 e C_4 submetidos a herbicidas inibidores do FSII, da síntese de carotenóides e da síntese das clorofilas.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Instalação do experimento e aplicação dos tratamentos

O experimento foi realizado no Laboratório de Metabolismo Vegetal do Departamento de Botânica da Universidade Federal de Pelotas, situada no município de Capão de Leão, RS. Sementes de milho e soja foram colocadas para germinar em vasos de polietileno, com capacidade de 10L contendo solo (previamente adubado com uréia) como substrato (Fig.11), em cada vaso foram colocadas 10 sementes, e após a emergência foi realizado o desbaste deixando cinco plantas por vaso, os quais foram mantidos em casa de vegetação, e sempre que necessário os vasos foram irrigados

Figura 11. Visão geral do experimento em casa-de-vegetação.

Quando as plantas estavam em estágio vegetativo pleno, procedeu-se à obtenção dos discos foliares de 10cm^2 (Fig.12A) utilizando-se sempre, folhas maduras. A seguir os discos foram imersos em água destilada por 20 minutos, para

evitar o efeito da difusão da água, em seguida foram imersos em soluções de herbicidas com diferentes modos de ação (tab. 1) nas concentrações de (0, 100, 250 e 500 μ M), sendo mantidos em caixas de plástico tipo gerbox, por um período de duas horas no escuro (Fig.12B). A concentração de 0 μ M foi considerada controle.

Após duas horas de imersão nos herbicidas, os discos foliares foram retirados das caixas gerbox, lavados com água destilada e secos com papel toalha, para imediata realização dos ensaios.

Figura 12. Obtenção dos discos foliares de plantas de milho (A) e imersão em caixas gerbox contendo os tratamentos herbicidas (B).

Tabela 1. Características dos tratamentos herbicidas utilizados

MECANISMO DE AÇÃO	INGREDIENTE ATIVO	NOME COMERCIAL	GRUPO QUÍMICO
Inibido de Fotossistema II	Bentazon	Basagran [®]	Bentazotadiona
Inibidor da Síntese de Carotenóides	Clomazone	Escudo 500 EC [®]	Isoxizoladinonas
Inibidor da Síntese de Clorofilas	Fomesafen	Flex [®]	Difeniléteres

2.2. Ensaio I: Efeito dos herbicidas sobre a fluorescência transiente

Após o período de imersão dos discos nos respectivos tratamentos a fluorescência transiente da clorofila *a* foi medida utilizando-se um fluorômetro portátil (HandyPEA, Hanstech, King's Lynn, Norfolk, UK). Para tanto, os discos foram inseridos nos cliques fornecidos pelo fabricante e colocados no escuro por 20 minutos, sendo utilizadas 15 repetições por tratamento. A emissão de fluorescência foi induzida em uma área de 4mm de diâmetro da folha pela exposição da amostra a

dois pulsos de luz saturante numa intensidade de $3.000 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$, sendo o intervalo entre os pulsos de 500ms (tempo suficientemente curto de escuro para permitir somente a reabertura dos RCs redutores de Q_B).

A partir da curva de emissão de fluorescência transiente obtida após o primeiro pulso, as intensidades determinadas a $50 \mu\text{s}$ (fluorescência inicial - F_0), 100 , $300 \mu\text{s}$, 2 (F_J) e 30 (F_I) ms e F_M (fluorescência máxima), foram utilizadas para o cálculo dos parâmetros estabelecidos pelo Teste JIP (STRASSER; STRASSER, 1995). Na tab. 2, são apresentados os principais parâmetros do Teste JIP.

Após o segundo pulso saturante, na mesma amostra, as intensidades de fluorescência inicial (F_0^*) e fluorescência máxima (F_M^*) foram utilizadas para determinar estimativa de centro de reação não-redutores de Q_B ($V_0^* = [(F_V/F_M) - (F_V^*/F_M^*)] / (F_V/F_M)$).

Tabela 2. Principais parâmetros do Teste JIP (Adaptada de: STRASSER et al., 2004 e YUSUF et al., 2010)

Parâmetros de fluorescência calculados a partir dos dados primários obtidos	
$F_V = F_M - F_0$	Fluorescência variável
F_V/F_M	Rendimento quântico máximo do FSII
V_t	Fluorescência variável relativa em um tempo "t"
V_j	Fluorescência variável relativa em relação ao nível J
V_i	Fluorescência variável relativa em relação ao nível I
$M_0 = 4(F_{300\mu s} - F_0)/(F_M - F_0)$	Declive inicial aproximado (em ms^{-1}) da fluorescência transiente $V = f(t)$
$S_s = V_j/M_0$	Área total normalizada complementar correspondente apenas a fase OJ (reflete um único volume de eventos de redução de Q_A)
$S_m = (Area)/(F_M - F_0)$	Área total normalizada complementar acima da curva OJIP (reflete múltiplos eventos de redução Q_A)
$N = S_m/S_s$	Número total de elétrons transferidos para a cadeia de transporte de elétrons entre o tempo de 0 et (necessário para atingir F_M)
Atividade específica por centro de reação (RC)	
$ABS/RC = M_0 (1/V_j) (1/\phi P_0)$	Medida do tamanho aparente do sistema antena ou o fluxo de absorção por RC
$TR_0/RC = M_0 (1/V_j)$	Máxima taxa pela qual um éxciton é capturado pelo RC resultando em uma redução da plastoquinona (Q_A^-)
$ET_0/RC = M_0 (1/V_j) \Psi_0$	Reoxidação da Q_A^- via transporte de elétrons em um RC ativo
$DI_0/RC = (ABS/RC) - (TR_0/RC)$	Razão de dissipação total de energia de excitação não capturada do total de RC, sendo a dissipação neste caso à perda de energia na forma de calor
RE_0/RC	Redução do acceptor final de elétrons no lado do acceptor de elétrons do FSI por RC
Rendimentos energéticos ou taxas de fluxo	
$\phi P_0 = TR_0/ABS = F_V/F_M$	Rendimento quântico máximo fotoquímico
$\phi E_0 = ET_0/ABS$	Rendimento quântico de transporte de elétrons de Q_A^- para o intersistema de aceptores de elétrons
$\phi_{D0} = 1 - \phi P_0 = (F_0/F_M)$	Rendimento quântico para dissipação de energia
$\phi_{R0} = RE_0/ABS$	Rendimento quântico de transporte de elétrons de Q_A^- para o acceptor final de elétrons do FSI
Eficiências	
$\psi_0 = ET_0/TR_0$	Eficiência com que um éxciton capturado no RC pode mover um elétron de Q_A^- para o intersistema de aceptores de elétrons
$\rho_0 = RE_0/TR_0$	Eficiência com que um éxciton capturado no RC pode mover um elétron dentro da cadeia de transporte de elétrons de Q_A^- para os aceptores finais de elétrons do FSI
$\delta_0 = RE_0/ET_0$	Eficiência com que um elétron pode mover o intersistema de aceptores de elétrons reduzidos no intersistema para o acceptor final de elétrons do FSI
Índices de desempenho	
$PI_{ABS} = \frac{RC}{ABS} \times \left(\frac{\phi_{P0}}{1 - \phi_{P0}} \right) \times \left(\frac{\psi_0}{1 - \psi_0} \right) = \frac{RC}{ABS} \times \frac{TR_0}{DI_0} \times \frac{ET_0}{1 - ET_0}$	Índice de desempenho fotossintético (conservação de energia a partir do éxciton para a redução dos aceptores de elétrons do intersistema)
$PI_{ABS, total} = PI_{ABS} \times \left(\frac{\delta_0}{1 - \delta_0} \right)$	Índice de desempenho fotossintético total (conservação de energia a partir do éxciton para a redução de aceptores finais do FSI)

2.3. Ensaio II: Efeito dos herbicidas sobre a fluorescência modulada da clorofila *a* e trocas gasosa

As determinações da fluorescência modulada das clorofilas e de trocas gasosas foram realizadas utilizando-se do analisador de gás a infravermelho IRGA LI 6400XT (LI-COR Inc., Lincoln, NE, USA), com câmara de fluorescência (6400-40 Leaf Chamber Fluorometer), com $380\mu\text{mol mol}^{-1}$ de CO_2 dentro da câmara. Para as avaliações foram utilizadas cinco repetições por tratamento e protocolo como descrito a seguir.

2.3.1. Cinética de relaxamento de fluorescência

Após os discos foliares serem submetidos aos tratamentos, os mesmos foram lavados com água destilada e secos com papel toalha, e imediatamente acondicionados na câmara de fluorescência e adaptados ao escuro por 10min. Em seguida, um pulso de luz saturante ($8.000\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$) foi emitido e assim se obteve os valores de fluorescência inicial (F_0) e fluorescência máxima (F_M). A seguir, a luz actínica foi ligada com radiação fotossinteticamente ativa de $100\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$, condição em que os discos permaneceram por 10 minutos, para estabilizar as taxas fotossintéticas, findo este período iniciou uma sequência de 20 pulsos de luz saturante ($8.000\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$), com intervalo de 30 segundos entre cada pulso. Em cada pulso foram obtidos os parâmetros, F_M' – fluorescência máxima em um estado adaptado à luz e F_0' – fluorescência mínima medida logo após desligar a luz actínica (pulso escuro), F_s – fluorescência alcançada no “steady-state” (Fig.13).

Obtidos estas intensidades de fluorescência, foram calculados os seguintes parâmetros: fluorescência variável em um estado adaptado a luz ($F_V' = F_M' - F_0'$); coeficientes de extinção fotoquímico ($qP = (F_M' - F_s)/(F_M' - F_0')$) e não-fotoquímico ($qN = (F_M - F_M')/(F_M - F_0')$ e $NPQ = (F_M - F_M')/F_M'$); eficiência quântica fotoquímica efetiva em estado adaptado a luz (F_V'/F_M') e rendimento quântico efetivo do FSII ($\phi_{FSII} = (F_M' - F_s)/F_M'$) (GENTY et al., 1989).

Figura 13. Análise geral da cinética de relaxamento de fluorescência pelo método de pulsos saturantes em função do tempo (Adaptado de: SCHEREIBER, 2004).

2.3.2. Curvas de fluorescência em resposta a luz

Em conjunto de discos foliares distintos foram realizadas as determinações das respostas fotossintéticas e de fluorescência a diferentes intensidades de luz.

Para estas medições, os discos foliares foram colocados na câmara de fluorescência, sem a necessidade de adaptação ao escuro, e mantidos por 3 minutos em diferentes intensidades de fluxo de fótons fotossinteticamente ativo ($2.000, 1600, 1200, 800, 400, 100$ e $0 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$). Imediatamente após cada período de luminosidade foi aplicado um pulso de luz saturante ($8000 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$). Após o pulso saturante foram determinadas as intensidades de fluorescência F_M' , F_0' e F_S , e a partir destas calculou-se os seguintes parâmetros: coeficiente de extinção fotoquímico (q_P); eficiência fotoquímica efetiva (F_V'/F_M'); rendimento quântico do FSII, calculado a partir da fluorescência ($\phi_{\text{FSII}} = ((F_M' - F_S) / F_M')$); rendimento quântico, calculado a partir da assimilação de CO_2 ($\phi_{\text{CO}_2} = ((A - A_{\text{escuro}}) / (I \times \alpha_{\text{folha}}))$), onde A é a taxa de assimilação, A_{escuro} a taxa de assimilação no escuro (ambos em $\mu\text{mol CO}_2 \text{ m}^{-2} \text{s}^{-1}$), I é a densidade do fluxo de fótons incidente ($\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$), e α_{folha} é a absorvância da folha (neste trabalho foi utilizado 0,85); e taxa de transporte de elétrons no FSII ($\text{ETR} = \phi_{\text{FSII}} \times f \times I \times \alpha_{\text{folha}}$), onde f é a fração de fótons absorvidos que são utilizados no FSII (neste trabalho assumido como sendo 0,5) (EARL; TOLLENAAR, 1998).

Associado as determinações de fluorescência modulada, foram determinados os parâmetros de trocas gasosas em cada intensidade de luz: taxa de assimilação líquida (A , $\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$), condutância estomática (g_s , $\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$) e concentração intercelular de CO_2 (C_i , $\mu\text{mol mol}^{-1}$). Os parâmetros fotossintéticos foram calculados de acordo com o proposto por Caemmerer e Farquhar (1981).

2.4. Delineamento experimental e análise estatística

O experimento foi conduzido em esquema fatorial 3x4, sendo o fator A o tipo de herbicida (tab. 1) e o fator B a concentração do herbicida (0, 100, 250 e 500 μM). Nos ensaios I e II, foram utilizadas 15 e 5 repetições por tratamento, respectivamente.

Os dados de F_0 , F_J , F_I , F_M , V_J , V_I , S_S , S_M , N , F_0^* , F_M^* e V_0^* nos ensaios foram submetidos à análise da variância (ANOVA, $p \leq 0,05$), e havendo significância as médias foram comparadas através do teste de Tukey ($p \leq 0,05$).

3. RESULTADOS

3.1. SOJA

3.1.1. Fluorescência transiente

3.1.1.1. *Cinética de emissão de fluorescência transiente da clorofila a*

A análise da emissão de fluorescência transiente da clorofila *a*, forneceu informações sobre a intensidade e a cinética de cada fase das curvas OJIP, obtidas a partir de discos foliares de soja submersos em diferentes soluções herbicidas (Fig. 14). Todos os transientes foram normalizados entre os passos O e P, a fim de revelar alterações mais específicas na forma destes entre os dois extremos. Os resultados referentes ao controle demonstram uma curva dupla sigmóide típica.

Para o herbicida bentazon foi observado comportamento dose-dependente, onde o aumento das doses ocasionou injúrias mais severas ao aparato fotossintético dos discos foliares de soja (Fig. 14A). A curva OJIP correspondente à dose de 500 μ M de bentazon perdeu totalmente a característica sigmóide entre os passos J-I, apresentando basicamente uma fase de indução única, resultado do bloqueio do transporte de elétrons de Q_A para Q_B , mecanismo de ação deste herbicida. Nesta dose saturante de inibidor de FSII, o nível de fluorescência no passo J foi próximo a F_M , devido ao fato de todas as Q_A s apresentarem reduzidas. Na dose de 250 μ M de bentazon o transiente ainda apresenta os passos J e I definidas, porém com intensidades de fluorescência superiores às do controle. Foram observados elevações nos níveis de V_J e V_I , resultado das intensidades elevadas de F_J e F_I , com o aumento crescente das doses do herbicida bentazon (tab. 3).

Figura 14. Fluorescência variável relativa (V_t) em discos foliares de soja submetidos a diferentes doses de herbicidas (A) Bentazon, (B) Clomazone e (C) Fomesafen. (n = 15).

A dose de 500 μ M do herbicida bentazon elevou em 20% S_S , o que demonstra aumento no volume de eventos responsáveis pela redução de Q_A antes do bloqueio do transporte de elétrons. Entretanto, os múltiplos eventos responsáveis pela redução de Q_A acima da OJIP (S_m) sofreram redução de 17% para esta mesma dose, o que resultou em decréscimo de 32% no número total de elétrons transferidos para a cadeia de transporte de elétrons (N). O mesmo ocorreu para as doses inferiores a 500 μ M de bentazon, porém em menores intensidades.

A ação do herbicida clomazone, inibidor da síntese de carotenóides, nos discos foliares de soja causou suaves alterações na curva OJIP, para todas as doses testadas, quando comparadas ao controle (Fig. 14B). A dose de 500 μ M deste herbicida reduziu em 10% os níveis de F_M e aumentou na mesma intensidade os níveis de V_J . Os múltiplos eventos responsáveis pela redução de Q_A acima da OJIP (S_m) e o número total de elétrons transferidos para a cadeia de transporte de elétrons (N) sofreram redução de 17% para esta mesma dose (tab. 3). As doses de 100 e 250 μ M de clomazone resultaram em decréscimo nos valores de F_M , porém não ocasionando redução nos valores de S_m e N.

As curvas transientes OJIP obtidas dos discos foliares tratados com o herbicida fomesafen, inibidor da síntese de clorofilas, não apresentaram diferença em relação ao controle (Fig. 14C). A dose de 250 μ M resultou em elevação significativa nos níveis de F_J e V_I , porém inferiores a 7% (tab. 3). Esta mesma dose reduziu os valores encontrados para S_m e N em 10%, quando comparados ao controle. O aumento da dose para 500 μ M, não aumentou a severidade dos danos ao aparato fotossintético dos discos foliares de soja tratados com o herbicida fomesafen.

Tabela 3. Intensidades de fluorescência da clorofila *a* nos passos O (F_o), J (F_J), I (F_I) e P (F_M), fluorescência variável relativa nos passos J (V_J) e I (V_I), área total normalizada complementar correspondente a fase OJ (S_S), área total normalizada complementar acima da OJIP (S_m) e número total de elétrons transferidos para a cadeia de transporte de elétrons (N), de discos foliares de soja submetidos a diferentes doses de herbicidas

Herbicida	Dose	Intensidade de fluorescência/parâmetros								
		F_o	F_J	F_I	F_M	V_J	V_I	S_S	S_m	N
Bentazon	Controle	772 c	2315 c	3081 ^{ns}	3684 ^{ns}	0,531 c	0,793 c	0,490 c	27,4 a	56,1 a
	100 μ M	808 b	2471 b	3137	3716	0,573 c	0,800 c	0,506 bc	25,2 ab	49,9 b
	250 μ M	841 b	2632 b	3092	3581	0,658 b	0,823 b	0,537 b	24,7 b	46,0 c
	500 μ M	958 a	3028 a	3317	3646	0,775 a	0,879 a	0,592 a	22,7 c	38,4 c
Clomazone	Controle	795 ^{ns}	2359 ^{ns}	3029 a	3590 a	0,564 b	0,800 ns	0,497 ns	27,5 a	55,4 a
	100 μ M	795	2249	2759 b	3253 b	0,592 b	0,798	0,467	26,6 a	56,9 a
	250 μ M	793	2320	2773 b	3325 b	0,606 b	0,781	0,467	25,6 a	54,8 a
	500 μ M	766	2347	2728 b	3242 b	0,641 a	0,792	0,499	22,8 b	45,6 b
Fomesafen	Controle	795 ^{ns}	2359 ab	3029 ^{ns}	3590 ^{ns}	0,564 ^{ns}	0,800 b	0,497 ^{ns}	27,5 a	55,4 a
	100 μ M	814	2375 ab	3006	3513	0,578	0,811 ab	0,486	26,0 ab	53,4 a
	250 μ M	834	2515 a	3155	3640	0,600	0,827 a	0,479	24,0 b	50,2 b
	500 μ M	775	2336 b	3034	3572	0,561	0,808 ab	0,504	27,0 a	53,3 a

Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste Tukey ($p = 0,05$) entre as doses dentro de cada herbicida, ns – não significativo; $n = 15$.

3.1.1.2. Teste JIP

A fluorescência transiente é rica em informações e sua intensidade pode ser utilizada para derivar diversos parâmetros (tab. 2) estabelecidos pelo Teste-JIP (STRASSER; STRASSER, 1995). A cuidadosa interpretação dos parâmetros medidos e calculados a partir deste teste fornece numerosas informações dos fluxos de energia através do FSII em diferentes níveis (STRASSER et al., 2004).

Os parâmetros obtidos através do Teste-JIP dos discos foliares de soja submersos em diferentes tratamentos herbicidas estão apresentados na Fig. 15. Para o herbicida bentazon foram observadas severas injúrias ao aparato fotossintético dos discos foliares de soja, sendo estas crescentes com o aumento da dose herbicida, o que pode ser observado pela redução dos parâmetros Φ_{Eo} , Φ_{Ro} , Ψ_o , ET_o/RC e RE_o/RC (Fig. 15A), sendo que os índices de desempenho, PI_{ABS} e

$PI_{ABS,total}$ foram os mais sensíveis à ação do herbicida bentazon, apresentando redução de aproximadamente 70% dos seus níveis na dose de $500\mu M$. As expressões para obtenção de PI_{ABS} e $PI_{ABS,total}$ são multiparamétricas, ou seja, combinam várias respostas parciais do aparato fotossintético, fornecendo informações valiosas sobre o seu funcionamento. Os parâmetros ABS/RC , TR_0/RC , DI_0/RC , φ_{D_0} e φ_{P_0} (F_V/F_M), demonstraram insensibilidade ao herbicida bentazon, mesmo em doses elevadas.

Os discos foliares de soja tratados com o herbicida clomazone apresentaram comportamento semelhante para todas as doses testadas (Fig. 15B). Os parâmetros φ_{E_0} , ψ_0 , ET_0/RC e RE_0/RC foram suavemente reduzidos, enquanto DI_0/RC sofreu leve elevação. O parâmetro mais afetado pela ação do herbicida clomazone foi o PI_{ABS} , sendo reduzido em aproximadamente 30% em relação ao controle.

Os resultados observados nos discos foliares de soja tratados com o herbicida fomesafen demonstram alteração apenas dos valores de PI_{ABS} e $PI_{ABS,total}$. Os dois parâmetros reduziram em 10 e 20%, respectivamente para as doses de 100 e $250\mu M$ do herbicida fomesafen. A dose de $500\mu M$ deste herbicida não apresentou alteração nos valores de nenhum dos parâmetros quantificados pelo Teste-JIP, quando comparados ao controle.

Figura 15. Alguns parâmetros do Teste JIP obtidos em discos foliares de soja submetidos a diferentes doses de herbicidas (A) Bentazon, (B) Clomazone e (C) Fomesafen, expresso em relação aos valores do tratamento controle (valor transformado para 1); (n = 15).

3.1.1.3. *Análise de duplo flash*

A análise da fluorescência transiente através da emissão de dois pulsos de luz consecutivos permitiu a avaliação da heterogeneidade do FSII, dos discos foliares de soja tratados com diferentes herbicidas (Fig. 16). Por intermédio destas análises, foi possível distinguir os centros de reação redutores de Q_B dos não redutores.

Os transientes obtidos pela emissão do segundo pulso de luz nos discos foliares de soja tratados com o herbicida bentazon, demonstram diferença em relação ao controle para todas as doses testadas, sendo esta diferença intensificada com o aumento da dose. As intensidades de fluorescência encontradas nos discos foliares tratados com o herbicida foram inferiores aquelas encontradas no tratamento controle (Fig. 16A). Reduções nos valores de F_0^* e V_0^* , respectivamente, em 15 e 30%, foram verificadas para a dose de $500\mu\text{M}$ do herbicida bentazon (tab. 4). Os valores de F_M^* não sofreram alteração significativa para este herbicida.

A aplicação do herbicida clomazone provocou alteração nos transientes do segundo pulso em relação ao controle, entretanto nenhuma diferença entre as doses do herbicida foi encontrada (Fig. 16B). Os discos foliares tratados com este herbicida sofreram redução de 5 e 10% nos índices de F_0^* e F_M^* , respectivamente, em relação ao controle, indiferentemente da dose aplicada (tab. 4). Ao passo que os valores de V_0^* para este herbicida, demonstraram suave elevação (inferior a 5%), para todas as doses avaliadas.

Os resultados referentes ao herbicida fomesafen não demonstraram diferença significativa nas intensidades de fluorescência obtidas a partir da emissão do segundo pulso de luz, entre as doses testadas e o tratamento controle (Fig. 16C).

Figura 16. Intensidade de fluorescência da clorofila *a* obtido em discos foliares de soja submetidos a dois pulso saturante com intervalo de 500 ms (A) Bentazon, (B) Clomazone e (C) Fomesafen.

Tabela 4. Intensidades de fluorescência da clorofila *a*, em discos foliares de soja, nos passos O (F_0^*) e P (F_M^*) após o segundo pulso de luz saturante e a estimativa da fração de centro de reação não redutor de Q_B (V_0^*)

Intensidade de fluorescência/parâmetro				
Herbicida	Dose	F_0^*	F_M^*	V_0^*
Bentazon	Controle	2137 a	3610 ^{ns}	0,483 a
	100 μ M	2126 a	3635	0,468 b
	250 μ M	1909 b	3506	0,403 c
	500 μ M	1831 b	3597	0,334 d
Clomazone	Controle	2118 a	3524 a	0,487 b
	100 μ M	2004 ab	3182 b	0,510 a
	250 μ M	2017 ab	3238 b	0,506 a
	500 μ M	1891 b	3155 b	0,476 b
Fomesafen	Controle	2118 ^{ns}	3524 ^{ns}	0,487 ^{ns}
	100 μ M	2110	3444	0,495
	250 μ M	2164	3559	0,491
	500 μ M	2101	3504	0,489

Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste Tukey ($p = 0,05$) entre as doses dentro de cada herbicida, ns – não significativo; $n = 15$

3.1.2. Fluorescência modulada

3.1.2.1. Análise de cinética de relaxamento

A análise da cinética de relaxamento da fluorescência em função de uma sequência de pulsos de luz saturante, proporcionou as avaliações da atividade fotossintética dos discos foliares de soja adaptados a luz.

Os resultados do tratamento controle demonstraram comportamento típico para todas as variáveis avaliadas (Fig. 17). Os parâmetros F_0' e F_s foram constantes em todos os pulsos de luz saturante, sendo mantidos aproximadamente em 500 e 600, respectivamente. Os níveis de F_M' , F_V'/F_M' , ϕ_{FSII} e qP decresceram com a sequência de pulsos saturantes para o tratamento controle, demonstrado pela suave inclinação das retas obtidas para estes parâmetros, apresentando valores mínimos de aproximadamente 1100, 0,6, 0,4 e 0,6, respectivamente. Inversamente, os níveis de qN e NPQ aumentaram com a sequência de pulsos de luz saturantes, apresentando valores máximos, no tratamento controle, de aproximadamente 0,55 e 0,95, respectivamente. Para o herbicida bentazon foram verificados aumentos nas

intensidades de fluorescência em todas as doses avaliadas, quando comparadas ao tratamento controle (Fig. 18). No primeiro pulso saturante foram observadas intensidades de fluorescência muito próximas para todas as doses de bentazon, entretanto, ao longo da sequencia de pulsos, foram verificadas curvas com inclinações mais acentuadas de acordo com o aumento da dose, o que demonstra menor desempenho do aparato fotossintético dos discos foliares de soja, nas doses mais elevadas. A aplicação do herbicida bentazon aproximou os valores de F_M' e F_s , chegando a valores iguais destas duas variáveis na dose de $500\mu\text{M}$.

O parâmetro F_V'/F_M' sofreu drástica alteração com o aumento da dose herbicida, sendo reduzido em 75% na dose de $500\mu\text{M}$, quando comparada ao controle. Além disso, embora os valores de F_V/F_M sejam próximos para todas as doses aplicadas, a diferença entre este parâmetro e F_V'/F_M' , salienta a baixa eficiência fotoquímica efetiva, nas doses mais elevadas do herbicida betazon. Severa redução nos valores de ϕ_{FSII} também foi detectada com o aumento da dose herbicida, sendo de 30, 80 e 100%, respectivamente, para as doses de 100, 250 e $500\mu\text{M}$. A mesma tendência foi verificada para qP , onde reduções semelhantes foram encontradas. Em contrapartida, foram verificadas elevações de até 50% nos valores de qN na aplicação da dose de $500\mu\text{M}$. A inclinação da curva obtida para NPQ dos discos foliares de soja tratados com o herbicida bentazon foi semelhante a do controle, porém com valores iniciais inferiores, exceto para a dose de $100\mu\text{M}$ onde NPQ se manteve praticamente constante durante a aplicação dos pulsos de luz (Fig. 18).

Figura 17. Análise de fluorescência modulada de discos foliares de soja submetidos ao tratamento controle (mais informações veja Figura 13). (F_0 = fluorescência inicial, F_M = fluorescência máxima em estado adaptado ao escuro, F_M' = fluorescência máxima em cada pulso saturante, F_s = fluorescência em estado de state-steady, F_V/F_M = eficiência fotoquímica máxima, F_V'/F_M' = eficiência fotoquímica máxima efetiva, ϕ_{PSII} = eficiência fotoquímica do fotossistema II, qP = coeficiente de extinção fotoquímico, qN = coeficiente de extinção não fotoquímico e NPQ = coeficiente de extinção não fotoquímico).

Figura 18. Análise de fluorescência modulada de discos foliares de soja submetidos ao herbicida bentazon em diferentes doses (mais informações veja Figura 13). (F_0 = fluorescência inicial, F_M = fluorescência máxima em estado adaptado ao escuro, F_M' = fluorescência máxima em cada pulso saturante, F_s = fluorescência em estado de state-steady, F_v/F_M = eficiência fotoquímica máxima, F_v/F_M' = eficiência fotoquímica máxima efetiva, ϕ_{PSII} = eficiência fotoquímica do fotossistema II, qP = coeficiente de extinção fotoquímico, qN = coeficiente de extinção não fotoquímico e NPQ = coeficiente de extinção não fotoquímico).

Para o herbicida clomazone aplicado na dose de $100\mu\text{M}$ nos discos foliares de soja, não houve alteração de nenhum dos parâmetros obtidos pela análise da cinética de relaxamento da fluorescência (Fig. 19), quando comparados ao tratamento controle (Fig. 17). No entanto, nas doses de 250 e $500\mu\text{M}$ foram observadas alterações nos parâmetros obtidos, sendo estas iguais para as duas doses. Para estas doses foi verificada elevação de aproximadamente 80% nos valores de F_s , chegando a níveis próximos de F_M' , sem alteração de F_0' . Além disto, os valores de F_s e F_M' , foram praticamente constantes, para todos os pulsos de luz saturante. Nestas mesmas doses os valores de $F_V'/F_M', \phi_{FSII}$, e qP obtidos demonstraram redução de 40, 85 e 90%, respectivamente. Para qN foram encontrados valores iniciais 65% superiores aos do controle, sendo estes valores constantes ao longo da avaliação. Enquanto, o comportamento de NPQ foi distinto entre as duas doses, sendo decrescente para $250\mu\text{M}$ e crescente para $500\mu\text{M}$ de clomazone, porém com valores próximos um ao outro (Fig. 19).

Nos discos foliares de soja tratados com o herbicida fomesafen, não foram observadas alterações nos parâmetros da cinética de relaxamento de fluorescência, para as doses de 100 e $250\mu\text{M}$ (Fig. 20), em relação ao controle (Fig. 17), exceto redução de 30% de NPQ, no final dos pulsos de luz saturantes, chegando a valores próximos a qN na dose de $250\mu\text{M}$. Na dose de $500\mu\text{M}$ de fomesafen houve redução de 20% nos valores de F_M' e elevação de 15% nos valores de F_s . Para $F_V'/F_M', qN$ e NPQ não foram verificadas alterações, enquanto que ϕ_{FSII} e qP foram reduzidos em 55 e 40% respectivamente, nesta mesma dose, quando comparados ao controle (Fig. 20).

Figura 19. Análise de fluorescência modulada de discos foliares de soja submetidos ao herbicida clomazone em diferentes doses (mais informações veja Figura 13). (F_0 = fluorescência inicial, F_M = fluorescência máxima em estado adaptado ao escuro, F_M' = fluorescência máxima em cada pulso saturante, F_S = fluorescência em estado de state-steady, F_V/F_M = eficiência fotoquímica máxima, F_V'/F_M' = eficiência fotoquímica máxima efetiva, ϕ_{FSII} = eficiência fotoquímica do fotossistema II, qP = coeficiente de extinção fotoquímico, qN = coeficiente de extinção não fotoquímico e NPQ = coeficiente de extinção não fotoquímico).

Figura 20. Análise de fluorescência modulada de discos foliares de soja submetidos ao herbicida fomesafen em diferentes doses (mais informações veja Figura 13). (F_0 = fluorescência inicial, F_M = fluorescência máxima em estado adaptado ao escuro, F_M' = fluorescência máxima em cada pulso saturante, F_s = fluorescência em estado de state-steady, F_V/F_M = eficiência fotoquímica máxima, F_V'/F_M' = eficiência fotoquímica máxima efetiva, ϕ_{PSII} = eficiência fotoquímica do fotossistema II, qP = coeficiente de extinção fotoquímico, qN = coeficiente de extinção não fotoquímico e NPQ = coeficiente de extinção não fotoquímico).

3.1.2.2. Análise de curva de intensidade luminosa vs. parâmetros de PAM

A relação entre a densidade de fluxo de luz e os parâmetros de fluorescência modulada permite avaliar a atividade do aparato fotossintético em diferentes condições fotossintéticas. Os discos foliares do tratamento controle apresentaram os parâmetros em intensidades típicas para plantas em condições normais (Fig. 21). Baixo valor de ETR foi observado no escuro, sendo este bruscamente elevado na densidade de fluxo luminoso de $500 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$, mantendo-se praticamente constante (em torno de 80) para as demais densidades do fluxo de luz. Enquanto, os valores de ϕ_{FSII} , F_V/F_M' e qP decresceram com o aumento da radiação, apresentando valores iniciais de 0,5, 0,6 e 0,8 e finais de 0,1, 0,35 e 0,3, respectivamente.

O herbicida bentazon na dose de $100 \mu\text{M}$ causou nas irradiações mais altas de luz, redução de até 40% nos valores de ETR. O ϕ_{FSII} , F_V/F_M' e qP sofreram leve queda nos seus valores iniciais, porém o comportamento com o incremento da radiação foi semelhante ao encontrado no tratamento controle. Para as doses de 250 e $500 \mu\text{M}$ foram observados resultados semelhantes, sendo estes mais intensos na dose mais alta do herbicida. Para estas doses foram verificadas reduções superiores a 90% para ETR e ϕ_{FSII} , e de até 80% para qP . Ao passo que F_V/F_M' se manteve constante em todas as densidades de fluxo de luz, com valores até 70% inferiores aos obtidos no tratamento controle (Fig. 22).

Figura 21. Curva de resposta à luz para os parâmetros de fluorescência modulada em discos foliares de soja submetidos ao tratamento controle. (ϕ_{FSII} = rendimento quântico do FSII, calculado a partir da fluorescência; ETR = taxa de transporte de elétrons no FSII; F_V/F_M' = eficiência fotoquímica efetiva; qP = coeficiente de extinção fotoquímico) (média $\pm$ erro padrão, $n = 5$). (Detalhes vide material e métodos).

Figura 22. Curva de resposta à luz para os parâmetros de fluorescência modulada em discos foliares de soja submetidos ao herbicida bentazon em diferentes doses (A) 100 μM , (B) 250 μM e (C) 500 μM . (ϕ_{PSII} = rendimento quântico do FSII, calculado a partir da fluorescência; ETR = taxa de transporte de elétrons no FSII; F_v/F_m' = eficiência fotoquímica efetiva; qP = coeficiente de extinção fotoquímica) (média $\pm$ erro padrão, $n = 5$). (Detalhes vide material e métodos).

Os resultados obtidos para o herbicida clomazone demonstraram comportamento semelhante entre as doses de 100 e 250 μ M avaliadas. Foram observadas reduções de até 25, 55, 65 e 50%, respectivamente, para qP, ϕ_{PSII} , ETR e F_V'/F_M' (Fig. 23), em relação ao controle (Fig. 17), sendo o último praticamente constante em todas as intensidades luminosas.

Figura 23. Curva de resposta a luz para os parâmetros de fluorescência modulada em discos foliares de soja submetidos ao herbicida clomazone em diferentes doses (A) 100 μ M e (B) 250 μ M. (ϕ_{FSII} = rendimento quântico do FSII, calculado a partir da fluorescência; ETR = taxa de transporte de elétrons no FSII; F_V'/F_M' = eficiência fotoquímica efetiva; qp = coeficiente de extinção fotoquímico) (média $\pm$ erro padrão, $n = 5$). (Detalhes vide material e métodos). Obs.: A dose de 500 μ M foi letal aos discos foliares, não permitindo análise.

O herbicida fomesafen não causou alterações significativas nos parâmetros avaliados quando utilizado na dose de 100 μ M. Quando aplicado nas doses de 250 e 500 μ M, provocou o mesmo efeito nos discos foliares de soja, reduzindo qp, ϕ_{FSII} , ETR e F_V'/F_M' em até 55, 70, 35 e 40%. Os resultados obtidos para F_V'/F_M' , demonstram que este parâmetro se mantém constante, independente da intensidade luminosa aplicada nos discos foliares de soja (Fig. 24).

Figura 24. Curva de resposta a luz para os parâmetros de fluorescência modulada em discos foliares de soja submetidos ao herbicida fomesafen em diferentes doses (A) 100 μM , (B) 250 μM e (C) 500 μM . (ϕ_{FSII} = rendimento quântico do FSII, calculado a partir da fluorescência; ETR = taxa de transporte de elétrons no FSII; F_v/F_m' = eficiência fotoquímica efetiva; q_P = coeficiente de extinção fotoquímico) (média $\pm$ erro padrão, $n = 5$). (Detalhes vide material e métodos).

Nas avaliações da resposta dos discos foliares de soja em função de intervalos de radiação fotossinteticamente ativa, a relação entre $\phi_{\text{FSII}}/\phi_{\text{CO}_2}$ pode ser obtida, proporcionando assim importantes informações sobre a capacidade das folhas em assimilar CO_2 . Sabe-se que entre estes dois parâmetros existe uma notável correlação, sendo a razão entre $\phi_{\text{FSII}}/\phi_{\text{CO}_2}$ constante dentro de um intervalo de aproximadamente 11 a 13 (EDWARDS; BAKER, 1993). Um valor de 12 para $\phi_{\text{FSII}}/\phi_{\text{CO}_2}$ implica que seis elétrons devem ser transportados através de FSII para cada molécula de CO_2 assimilado (EDWARDS; BAKER, 1993). Medições de ϕ_{FSII} e ϕ_{CO_2} foram realizadas no intervalo de 100 a 2000 $\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$ de radiação fotossinteticamente ativa. A partir destas medições, gráficos $\phi_{\text{FSII}}/\phi_{\text{CO}_2}$ foram plotados e equações foram obtidas para verificar o ajuste dos pontos a uma reta que equivale à razão $\phi_{\text{FSII}}/\phi_{\text{CO}_2}$ igual a 12. Para os resultados do tratamento controle (Fig. 25), os dados ajustaram-se em 80% a uma reta ($R^2 = 0,80$), apresentando dispersão de apenas alguns pontos do previsto.

Figura 25. Relação entre o rendimento quântico calculado a partir da assimilação de CO_2 (ϕ_{CO_2}) e o rendimento quântico do FSII calculado a partir da fluorescência (ϕ_{FSII}) para discos foliares de soja submetidos ao tratamento controle.

Os discos foliares tratados com o herbicida bentazon nas doses de 100 e 250 μ M demonstraram ajuste a curva semelhante ao obtido para o tratamento controle, porém com valores reduzidos de φ_{FSII} e φ_{CO_2} . A dose de 500 μ M não apresentou ajuste significativo a reta, devido aos valores muito próximos a zero encontrados para os dois parâmetros. As duas doses avaliadas do herbicida clomazone demonstraram ajuste a reta inferior a 60%. Isto se deve, aos altos valores obtidos para φ_{FSII} em relação aos obtidos para φ_{CO_2} . Para o herbicida fomesafen não foram encontrados ajustes significativos para nenhuma das doses avaliadas, devido aos valores superiores a 12 encontrados para a relação $\varphi_{\text{FSII}}/\varphi_{\text{CO}_2}$ (Fig. 26).

Figura 26. Relação entre o rendimento quântico calculado a partir da assimilação de CO_2 (Φ_{CO_2}) e o rendimento quântico do FSII calculado a partir da fluorescência (Φ_{FSII}) para discos foliares de soja submetidos aos tratamentos com herbicidas: bentazon (A-C, doses de 100, 250 e 500 μ M), clomazone (D-E, doses de 100 e 250 μ M) e fomesafen (F-H, doses de 100, 250 e 500 μ M).

3.1.3. Trocas gasosas

Os parâmetros de trocas gasosas em função da intensidade luminosa crescente (curvas de luz) foram obtidos dos discos foliares de soja expostos a diferentes tratamentos herbicidas. Os resultados obtidos para o tratamento controle encontram-se na Fig. 27. Valores próximos a $300 \mu\text{mol mol}^{-1}$ foram obtidos para C_i no escuro, sendo estes reduzidos a 240 na presença de luz e constantes em todas as intensidades luminosas. Para A e g , foram encontrados valores próximos a zero no escuro, sendo estes crescentes com o aumento da radiação, chegando a níveis próximos a $13 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$ e $0,19 \text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$, respectivamente. A ação do herbicida bentazon (Fig. 28) diminuiu a taxa fotossintética líquida (A) e a condutividade estomática (g) para todas as irradiâncias nas três doses avaliadas. Reduções de aproximadamente 40 e 100% foram verificadas respectivamente para A e g , na dose de $500 \mu\text{M}$. A concentração interna de CO_2 (C_i) se manteve próxima ao controle na dose de $100 \mu\text{M}$, sendo elevada em 30 e 40%, respectivamente para as doses de 250 e $500 \mu\text{M}$ do mesmo herbicida.

Figura 27. Curva de resposta a luz para os parâmetros trocas gasosas em discos foliares de soja submetidos ao tratamento controle. (A = taxa fotossintética líquida em $\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$; g = condutância estomática em $\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$ e C_i = concentração intercelular de CO_2 em $\mu\text{mol mol}^{-1}$) (média $\pm$ erro padrão, $n = 5$). (Detalhes vide material e métodos).

Figura 28. Curva de resposta a luz para os parâmetros trocas gasosas em discos foliares de soja submetidos ao herbicida bentazon em diferentes doses (A) $100\mu\text{M}$, (B) $250\mu\text{M}$ e (C) $500\mu\text{M}$. (A = taxa fotossintética líquida em $\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$; g = condutância estomática em $\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$ e Ci = concentração intercelular de CO_2 em $\mu\text{mol mol}^{-1}$) (média $\pm$ erro padrão, $n = 5$). (Detalhes vide material e métodos).

O impacto do herbicida clomazone (Fig. 29) sobre a taxa fotossintética líquida dos discos foliares de soja foi semelhante ao encontrado para herbicida bentazon, sendo observadas reduções de até 70% na dose de 250 μ M. A condutividade estomática teve incremento de seus valores em até 75% para as intensidades de luz mais elevadas nas avaliações da dose de 100 μ M do herbicida clomazone. Em contrapartida, na dose de 250 μ M do mesmo herbicida, foram observadas reduções de aproximadamente 20% em todas as irradiâncias avaliadas. Os dados de C_i foram semelhantes para as duas doses de clomazone avaliadas, sendo mantidos aproximadamente 20% superiores ao tratamento controle.

A dose de 100 μ M do herbicida fomesafen (Fig. 30) aplicado nos discos foliares de soja reduziu em até 40 e 50%, respectivamente, os valores de A e g, e elevou em 20% a C_i . Para este mesmo herbicida foram obtidos resultados semelhantes para as doses de 250 e 500 μ M avaliadas. A ação do herbicida resultou em elevação de 33 e 75% nos valores de C_i e g, respectivamente, sendo para o último parâmetro marcante apenas a partir da intensidade de 1200 $\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$ de luz. Para estas duas doses de fomesafen foram observadas reduções de até 45% nos valores de A obtidos, quando comparados ao controle.

Figura 29. Curva de resposta a luz para os parâmetros trocas gasosas em discos foliares de soja submetidos ao herbicida clomazone em diferentes doses (A) 100 μM e (B) 250 μM . (A = taxa fotossintética líquida em $\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$; g = condutância estomática em $\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$ e Ci = concentração intercelular de CO_2 em $\mu\text{mol mol}^{-1}$) (média $\pm$ erro padrão, $n = 5$). (Detalhes vide material e métodos). Obs.: A dose de 500 μM foi letal aos discos foliares, não permitindo análise.

Figura 30. Curva de resposta a luz para os parâmetros trocas gasosas em discos foliares de soja submetidos ao herbicida fomasagfem em diferentes doses (A) 100 μM , (B) 250 μM e (C) 500 μM . (A = taxa fotossintética líquida em $\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$; g = condutância estomática em $\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$ e Ci = concentração intercelular de CO_2 em $\mu\text{mol mol}$) (média $\pm$ erro padrão, $n = 5$). (Detalhes vide material e métodos).

3.2. Milho

3.2.1. Fluorescência transiente

3.2.1.1. *Cinética de emissão de fluorescência transiente da clorofila a*

Os resultados obtidos para a cinética de emissão de fluorescência transiente da clorofila *a* (curvas OJIP), dos discos foliares de milho tratados com diferentes soluções herbicidas encontram-se na Fig. 31. Assim como na soja, os transientes foram normalizados entre os passos O e P, com o objetivo de obter alterações mais específicas na forma destes entre os dois extremos.

Para o tratamento controle foi obtida uma curva com formato sigmóide característica, com os passos O, J, I e P bem definidos. Foi observado um aumento progressivo, de acordo com a dose, na intensidade de fluorescência no ponto J, quando aplicado o herbicida bentazon (Fig. 31A), porém as curvas OJIP não perderam a forma sigmoidal. Além de F_J , os valores de V_J e S_s também sofreram elevação em relação ao controle, sendo esta mais significativa para a dose de $500\mu\text{M}$ de bentazon (tab. 5).

As curvas OJIP obtidas para os herbicidas clomazone e fomesafen não demonstraram alteração em relação ao controle para todas as doses avaliadas (Fig. 31B e 31C). Já os parâmetros de fluorescência obtidos a partir dos dados primários mostraram que o herbicida clomazone causou alterações significativas nos valores de F_I , F_M , S_s e V_J , sendo os três primeiros reduzidos em aproximadamente 10% e o último elevado em 7%, quando aplicado na dose de $500\mu\text{M}$ (tab. 5). Para o herbicida fomesafen houve diferença significativa entre os tratamentos herbicidas e o controle, porém as três doses herbicidas avaliadas não diferiram entre si. Houve acréscimo de 9 e 6%, respectivamente nos valores de V_J e V_I , e redução de 19% de S_m , sendo este parâmetro o mais afetado pelo herbicida (tab. 5).

Figura 31. Fluorescência variável relativa (V_t) em discos foliares de milho submetidos a diferentes doses de herbicidas (A) Bentazon, (B) Clomazone e (C) Fomesafen. (n = 15).

Tabela 5. Intensidades de fluorescência da clorofila a nos passos O (F_0), J (F_J), I (F_I) e P (F_M), fluorescência variável relativa nos passos J (V_J) e I (V_I), área total normalizada complementar correspondente a fase OJ (S_S), área total normalizada complementar acima da OJIP (S_m) e número total de elétrons transferidos para a cadeia de transporte de elétrons (N), de discos foliares de milho submetidos a diferentes doses de herbicidas

Herbicida	Dose	Intensidade de fluorescência/parâmetros								
		F_0	F_J	F_I	F_M	V_J	V_I	S_S	S_m	N
Bentazon	Controle	710 ^{ns}	1742 ^b	2418 ^{ns}	2774 ^{ns}	0,503 ^c	0,830 ^{ns}	0,403 ^b	17,9 ^{ns}	44,4 ^{ns}
	100 μ M	771	1962 ^{ab}	2464	2857	0,577 ^b	0,814	0,408 ^b	18,6	45,6
	250 μ M	736	1906 ^{ab}	2290	2621	0,623 ^a	0,826	0,418 ^{ab}	17,9	42,8
	500 μ M	759	2073 ^a	2336	2648	0,699 ^a	0,837	0,441 ^a	18,1	41,1
Clomazone	Controle	696 ^{ns}	1712 ^s	2430 ^a	2915 ^a	0,457 ^b	0,780 ^{ns}	0,408 ^a	20,7 ^{ns}	50,5 ^{ns}
	100 μ M	703	1745	2443 ^a	2891 ^a	0,476 ^{ab}	0,795	0,404 ^{ab}	18,9	46,8
	250 μ M	702	1712	2430 ^a	2851 ^a	0,471 ^{ab}	0,804	0,385 ^{bc}	17,6	45,8
	500 μ M	692	1631	2163 ^b	2603 ^b	0,493 ^a	0,769	0,373 ^c	19,6	52,5
Fomesafen	Controle	696 ^{ns}	1712 ^{ns}	2430 ^{ns}	2915 ^{ns}	0,457 ^b	0,780 ^b	0,408 ^{ns}	20,7 ^a	50,5 ^a
	100 μ M	686	1721	2406	2801	0,491 ^a	0,815 ^{ab}	0,427	17,7 ^b	41,2 ^b
	250 μ M	689	1740	2405	2801	0,498 ^a	0,813 ^{ab}	0,416	17,6 ^b	42,3 ^b
	500 μ M	697	1740	2439	2793	0,497 ^a	0,830 ^a	0,415	16,8 ^b	40,4 ^b

Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste Tukey ($p = 0,05$) entre as doses dentro de cada herbicida, ns – não significativo; $n = 15$.

3.2.1.2. Teste JIP

A partir dos resultados obtidos sobre o comportamento polifásico do aumento da fluorescência foi possível se obter uma série de parâmetros matemáticos por meio do Teste JIP (STRASSER; STRASSER, 1995; TSIMILLI; STRASSER, 2008). O uso correto destes parâmetros permitiu a quantificação do fluxo de energia absorvido e aproveitado no sistema fotossintético, proporcionando a avaliação do desempenho fotossintético de plantas. Os dados do tratamento controle foram transformados para "1" (centro do radar), permitindo assim, a visualização da variação dos demais parâmetros em relação a ele (Fig. 32). Para o herbicida bentazon, declínios em torno de 40% nos valores dos parâmetros ET_0/RC , ψ_0 e ϕE_0 foram verificados para a dose de 500 μ M. A maior redução observada para o herbicida bentazon foi de 30, 45 e 60% em PI_{ABS} , respectivamente para as doses de 100, 250 e 500 μ M. Já $PI_{ABS\text{total}}$ foi

pouco afetado pelo herbicida, sendo reduzido em apenas 13% na maior dose aplicada (Fig. 32A).

O herbicida clomazone (Figura 32B) aplicado nos discos foliares de milho na dose de 500 μ M resultou no aumento dos níveis dos parâmetros ABS/RC e DI_0 /RC respectivamente em 12 e 25%. Quando aplicado na dose de 100 μ M o herbicida não afetou estes parâmetros. Os índices de desempenho também foram afetados pela ação do herbicida. PI_{ABS} foi reduzido em 10, 15 e 30% respectivamente para as doses de 100, 250 e 500 μ M de clomazone. Já $PI_{ABStotal}$ foi reduzido em 12, 25 e 18% nas mesmas doses do herbicida.

A aplicação do herbicida fomesafen afetou os parâmetros fotossintéticos avaliados pelo teste JIP (Fig. 32C). Os dois índices de desempenho foram prejudicados sendo $PI_{ABStotal}$ duas vezes mais afetado que PI_{ABS} , apresentando declínio de 25, 25 e 40%, respectivamente para as doses de 100, 250 e 500 μ M do herbicida. Os parâmetros RE/RC e ϕ_{R0} também foram reduzidos em aproximadamente 15, 17 e 25%, nas mesmas doses de fomesafen, em relação ao tratamento controle.

Figura 32. Alguns parâmetros do Teste JIP obtidos em discos foliares de milho submetidos a diferentes doses de herbicidas (A) Bentazon, (B) Clomazone e (C) Fomesafen, expresso em relação aos valores do tratamento controle (valor transformado para 1); (n = 15).

3.2.1.3. *Análise de duplo flash*

Com base nas propriedades de transporte de elétrons no lado redutor dos centros de reação do PSII, sabe-se que duas formas distintas de centro de reação são encontradas, ou seja, aqueles capazes de reduzir Q_B e incapazes de realizar esta redução. A distinção entre estas duas formas de centro de reação foi realizada pela emissão de dois pulsos de luz saturante nos discos foliares de milho, submetidos à ação dos diferentes herbicidas, e os resultados encontram-se na Fig. 33.

Os dados referentes ao tratamento controle demonstram o comportamento padrão, onde os valores de F_0^* são superiores aos encontrados para F_0 e as intensidades de F_J^* são próximas a F_M^* , sem a fase JI distinta. Para o herbicida bentazon, os valores encontrados de F_0^* para as doses de 250 e 500 μM , diferiram significativamente em relação ao controle, sendo reduzidos em 15 e 20%, respectivamente (tab. 6). Essa redução também é demonstrada na curva OJIP do herbicida bentazon (Fig. 33A). Os valores de V_0^* também foram reduzidos pela ação do herbicida, sendo esta de 20% para as doses de 100 e 250 μM e de 30% para a dose de 500 μM .

Figura 33. Intensidade de fluorescência da clorofila *a* obtido em discos foliares de milho submetidos a dois pulsos saturante com intervalo de 500ms (A) Bentazon, (B) Clomazone e (C) Fomesafen.

Tabela 6. Intensidades de fluorescência da clorofila *a*, em discos foliares de milho, nos passos O (F_0^*) e P (F_M^*) após o segundo pulso de luz saturante e a estimativa da fração de centro de reação não redutor de Q_B (V_0^*)

Intensidade de fluorescência/parâmetros				
Herbicida	Dose	F_0^*	F_M^*	V_0^*
Bentazon	Controle	1780 a	2719 ^{ns}	0,537 a
	100 μ M	1708 a	2790	0,469 b
	250 μ M	1519 b	2552	0,436 b
	500 μ M	1442 b	2583	0,380 c
Clomazone	Controle	1776 ^{ns}	2841 ^{ns}	0,508 b
	100 μ M	1792	2807	0,523 ab
	250 μ M	1778	2765	0,525 ab
	500 μ M	1676	2539	0,537 a
Fomesafen	Controle	1776 ^{ns}	2841 ^{ns}	0,508 ^{ns}
	100 μ M	1731	2773	0,515
	250 μ M	1718	2726	0,509
	500 μ M	1738	2709	0,522

Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste Tukey ($p = 0,05$) entre as doses dentro de cada herbicida, ns – não significativo; $n = 15$.

A ação do herbicida clomazone só causou diferença significativa em relação ao controle no parâmetro V_0^* , sendo este elevado em 6% na dose de 500 μ M do herbicida (tab. 6). Além disso, esta mesma dose causou redução dos valores de F_M^* (Fig. 33B), quando comparados ao controle, porém esta redução não foi significativa. O herbicida fomesafen aplicado nos discos foliares de milho, não demonstrou diferença significativa em nenhum dos parâmetros, para as três doses avaliadas, em comparação ao tratamento controle (Fig. 33C).

3.2.2. Fluorescência modulada

3.2.2.1. *Análise de cinética de relaxamento*

Os resultados obtidos na análise da cinética de relaxamento dos discos foliares de milho do tratamento controle encontram-se na Fig. 34. Foram observados valores praticamente constantes ao longo dos pulsos de luz para F_0' , F_s , F_M' , F_v'/F_M' , ϕ_{FSII} e qP , sendo estes próximos a 500, 500, 1100, 0,62, 0,55 e 0,9, respectivamente. Já qN e NPQ sofreram suave elevação ao longo dos pulsos de luz, apresentando valores finais próximos a 0,5 e 0,6, respectivamente.

Os discos foliares de milho submersos nas doses de 100 e 250 μ M do herbicida bentazon apresentaram resultados semelhantes aos obtidos para o tratamento controle, para todos os parâmetros avaliados (Fig. 35). Para a dose de 500 μ M foi observado aumento nas intensidades de F_M' e F_0' , em 20 e 70%, respectivamente. A intensidade de F_s nesta dose foi o dobro da encontrada para o tratamento controle. Os valores de F_v'/F_M' , ϕ_{FSII} , qP , qN e NPQ foram reduzidos em 35, 50, 30, 10 e 40%, respectivamente.

Figura 34. Análise de fluorescência modulada de discos foliares de milho submetidos ao tratamento controle (mais informações veja Figura A). (F_0 = fluorescência inicial, F_M = fluorescência máxima em estado adaptado ao escuro, F_M' = fluorescência máxima em cada pulso saturante, F_s = fluorescência em estado de state-steady, F_V/F_M = eficiência fotoquímica máxima, F_V/F_M' = eficiência fotoquímica máxima efetiva, ϕ_{PSII} = eficiência fotoquímica do fotossistema II, qP = coeficiente de extinção fotoquímico, qN = coeficiente de extinção não fotoquímico e NPQ = coeficiente de extinção não fotoquímico).

Figura 35. Análise de fluorescência modulada de discos foliares de milho submetidos ao herbicida bentazon em diferentes doses (mais informações veja Figura A). (F_0 = fluorescência inicial, F_M = fluorescência máxima em estado adaptado ao escuro, F_M' = fluorescência máxima em cada pulso saturante, F_s = fluorescência em estado de state-steady, F_V/F_M = eficiência fotoquímica máxima, F_V'/F_M' = eficiência fotoquímica máxima efetiva, Φ_{PSII} = eficiência fotoquímica do fotossistema II, qP = coeficiente de extinção fotoquímico, qN = coeficiente de extinção não fotoquímico e NPQ = coeficiente de extinção não fotoquímico).

Para a dose de $100\mu\text{M}$ do herbicida clomazone todos os parâmetros foram semelhantes aos encontrados para o controle, com exceção de qN e NPQ que apresentaram valores 25 e 45% superiores (Fig. 36). Para as outras duas doses avaliadas, F_0' e F_s se mantiveram semelhantes aos obtidos para o controle, porém F_M' foi reduzido em 35%. Os valores iniciais de F_V'/F_M' foram reduzidos em 20 e 35%, os de ϕ_{FSII} em 30 e 65%, e os de qP em 10 e 45%, respectivamente para as doses de 250 e $500\mu\text{M}$ do herbicida clomazone. Também, os valores de qN e NPq foram fortemente afetados pela ação do clomazone, sendo o primeiro elevado em 50 e 75%, respectivamente para as doses de 250 e $500\mu\text{M}$. Do mesmo modo, NPQ teve valores iniciais muito elevados de 120 e 140% superiores aos do controle para as doses de 250 e $500\mu\text{M}$ de clomazone, sendo estes reduzidos ao longo dos pulsos de luz, chegando a valores próximos a 0,8 e 0,9 para as doses de 250 e $500\mu\text{M}$ do herbicida.

Os parâmetros obtidos dos discos foliares de milho expostos ao herbicida fomesafen não demonstraram diferença em relação ao controle, em nenhuma das doses avaliadas, com exceção de NPQ que na dose de $100\mu\text{M}$ sofreu elevação inicial de 20%, chegando esta a 40% nos últimos pulsos de luz aplicados. Entretanto, nas doses de 250 e $500\mu\text{M}$, os valores iniciais de NPQ não foram alterados, porém no final da avaliação foram elevados em aproximadamente 10%, quando comparados ao tratamento controle (Fig.37).

Figura 36. Análise de fluorescência modulada de discos foliares de milho submetidos ao herbicida clomazone em diferentes doses (mais informações veja Figura A). (F_0 = fluorescência inicial, F_M = fluorescência máxima em estado adaptado ao escuro, F_M' = fluorescência máxima em cada pulso saturante, F_s = fluorescência em estado de state-steady, F_V/F_M = eficiência fotoquímica máxima, F_V/F_M' = eficiência fotoquímica máxima efetiva, ϕ_{PSII} = eficiência fotoquímica do fotossistema II, qP = coeficiente de extinção fotoquímico, qN = coeficiente de extinção não fotoquímico e NPQ = coeficiente de extinção não fotoquímico).

Figura 37. Análise de fluorescência modulada de discos foliares de milho submetidos ao herbicida fomesafen em diferentes doses (mais informações veja Figura A). (F_0 = fluorescência inicial, F_M = fluorescência máxima em estado adaptado ao escuro, F_M' = fluorescência máxima em cada pulso saturante, F_s = fluorescência em estado de state-steady, F_v/F_M = eficiência fotoquímica máxima, F_v'/F_M' = eficiência fotoquímica máxima efetiva, ϕ_{PSII} = eficiência fotoquímica do fotossistema II, qP = coeficiente de extinção fotoquímico, qN = coeficiente de extinção não fotoquímico e NPQ = coeficiente de extinção não fotoquímico).

3.2.2.2. Análise de curva de intensidade luminosa vs parâmetros de PAM

A atividade fotossintética dos discos foliares de milho expostos a diferentes intensidades luminosas foi observada através das curvas de luz. Os resultados referentes ao tratamento controle demonstraram altos valores de F_v'/F_m' , ϕ_{PSII} e qP no escuro, em torno de 0,55, 0,45 e 0,85, respectivamente, sendo estes reduzidos exponencialmente com o aumento da radiação, para aproximadamente 0,25, 0,06 e 0,3, respectivamente. Para ETR foram encontrados valores baixos no escuro, em torno de 24, sendo estes elevados para 65 na intensidade de luz de $500 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$, e a partir daí foram mantidos praticamente constantes nas radiações mais elevadas (Fig. 38).

Figura 38. Curva de resposta à luz para os parâmetros de fluorescência modulada em discos foliares de milho submetidos ao tratamento controle. (ϕ_{PSII} = rendimento quântico do FSII, calculado a partir da fluorescência; ETR = taxa de transporte de elétrons no FSII; F_v'/F_m' = eficiência fotoquímica efetiva; qP = coeficiente de extinção fotoquímica) (média $\pm$ erro padrão, $n = 5$). (Detalhes vide material e métodos).

Para o herbicida bentazon foram avaliadas apenas as doses de 100 e 250 μM (Fig. 39). O efeito da ação do herbicida bentazon nos discos foliares de milho foi semelhante para as duas doses avaliadas, porém mais intenso na dose de 250 μM . Nesta dose foram verificadas reduções nos valores iniciais de ϕ_{PSII} , qP e F_v'/F_m' em 40, 20 e 33%, respectivamente. A intensidade de ETR foi reduzida em aproximadamente 40% na radiação de $500 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$, sendo esta redução mantida nas demais intensidades de luz (Fig. 39B).

Figura 39. Curva de resposta à luz para os parâmetros de fluorescência modulada em discos foliares de milho submetidos ao herbicida bentazon em diferentes doses (A) 100 μM e (B) 250 μM . (ϕ_{FSII} = rendimento quântico do FSII, calculado a partir da fluorescência; ETR = taxa de transporte de elétrons no FSII; F_v/F_m' = eficiência fotoquímica efetiva; qP = coeficiente de extinção fotoquímico) (média $\pm$ erro padrão, $n = 5$). (Detalhes vide material e métodos). Obs.: A dose de 500 μM foi letal aos discos foliares, não permitindo análise.

Os discos foliares de milho submetidos à ação do herbicida clomazone na dose de 100 μM , não apresentaram diferença em seus parâmetros quando comparados ao controle (Fig. 40A). Para a dose de 250 μM foi verificadodecréscimode 23% nos valores de ETR nas radiações de 500 e 1000 $\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$, sendo este ainda mais acentuado (aproximadamente 45%), nas radiações mais elevadas. Para ϕ_{FSII} , qP e F_v/F_m' foram observadas reduções de 22, 11 e 15%, respectivamente, quando comparados ao tratamento controle (Fig. 40B). A dose de 500 μM do herbicida clomazone não foi avaliada.

Figura 40. Curva de resposta à luz para os parâmetros de fluorescência modulada em discos foliares de milho submetidos ao herbicida clomazone em diferentes doses (A) 100 μM e (B) 250 μM . (Φ_{PSII} = rendimento quântico do FSII, calculado a partir da fluorescência; ETR = taxa de transporte de elétrons no FSII; F_v'/F_m' = eficiência fotoquímica efetiva; qP = coeficiente de extinção fotoquímico) (média $\pm$ erro padrão, $n = 5$). (Detalhes vide material e métodos). Obs.: A dose de 500 μM foi letal aos discos foliares, não permitindo análise.

A aplicação do herbicida fomesafen nos discos foliares de milho resultou em suave redução dos parâmetros avaliados, quando comparados ao tratamento controle, sendo esta redução mais significativa apenas na dose de 500 μM (Fig. 41). Nesta dose o parâmetro mais afetado foi ETR, sofrendo declínio de 40% em seus valores finais. Os parâmetros Φ_{PSII} , qP e F_v'/F_m' sofreram redução de 23, 12 e 13% respectivamente (Fig. 41C).

Figura 41. Curva de resposta à luz para os parâmetros de fluorescência modulada em discos foliares de milho submetidos ao herbicida fomesafen em diferentes doses (A) 100 μM , (B) 250 μM e (C) 500 μM . (ϕ_{PSII} = rendimento quântico do PSII, calculado a partir da fluorescência; ETR = taxa de transporte de elétrons no PSII; F_v/F_m' = eficiência fotoquímica efetiva; qP = coeficiente de extinção fotoquímica) (média $\pm$ erro padrão, $n = 5$). (Detalhes vide material e métodos).

No intervalo de radiação (de 100 a 2000 $\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$) utilizada para as avaliações das curvas de luz dos discos foliares de milho, foram determinados os parâmetros ϕ_{FSII} e ϕ_{CO_2} . A relação entre estes dois parâmetros é uma forma eficaz de examinar o transporte de elétrons e a assimilação de CO_2 . Gráficos demonstrando a relação $\phi_{\text{FSII}}/\phi_{\text{CO}_2}$ foram gerados, e a partir destes foram obtidas equações para verificar o ajuste dos pontos a uma reta que equivale à razão $\phi_{\text{FSII}}/\phi_{\text{CO}_2}$ igual a 12. Os pontos obtidos a partir da relação $\phi_{\text{FSII}}/\phi_{\text{CO}_2}$ do tratamento controle, demonstraram ajuste de 91% a uma reta, o que demonstra uma relação $\phi_{\text{FSII}}/\phi_{\text{CO}_2}$ próxima a 12 (Fig. 42).

Figura 42. Relação entre o rendimento quântico calculado a partir da assimilação de CO_2 (ϕ_{CO_2}) e o rendimento quântico do FSII calculado a partir da fluorescência (ϕ_{FSII}), para discos foliares de milho submetidos ao tratamento controle.

Os herbicidas bentazon, clomazone e fomesafen, em todas as doses avaliadas, demonstraram através dos gráficos obtidos, ajuste acima de 94% a uma reta que representa a razão $\phi_{\text{FSII}}/\phi_{\text{CO}_2}$ igual a 12 (Figura 43). Isto indica que os herbicidas não influenciaram a relação $\phi_{\text{FSII}}/\phi_{\text{CO}_2}$ dos discos foliares de milho avaliados.

Figura 43. Relação entre o rendimento quântico calculado a partir da assimilação de CO_2 (Φ_{CO_2}) e o rendimento quântico do FSII calculado a partir da fluorescência (Φ_{FSII}), para discos foliares de milho submetidos aos tratamentos com herbicidas: bentazon (A-B, doses de 100 e 250 μM), clomazone (C-D, doses de 100 e 250 μM) e fomesafen (E-G, doses de 100, 250 e 500 μM).

3.2.3. Trocas gasosas

Os resultados referentes às trocas gasosas dos discos foliares de milho do tratamento controle estão demonstrados na Fig. 44. O aumento da radiação elevou quase linearmente os valores de A e g, sendo estes 22 e 0,15, respectivamente na intensidade de luz mais elevada ($2000\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$). No escuro os valores de A e g se aproximaram a zero. A C_i foi de aproximadamente 220 no escuro, porém este valor foi reduzido para 120 na radiação de $500\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$, sendo este valor mantido para as demais intensidades luminosas.

Figura 44. Curva de resposta à luz para os parâmetros de trocas gasosas em discos foliares de milho submetidos ao tratamento controle. (A = taxa fotossintética líquida em $\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$; g = condutância estomática em $\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$ e C_i = concentração intercelular de CO_2 em $\mu\text{mol mol}$) (média $\pm$ erro padrão, $n = 5$). (Detalhes vide material e métodos).

A aplicação do herbicida bentazon reduziu, nas duas doses avaliadas, os valores finais de A e g em 30 e 20%, respectivamente. Em contrapartida, a Ci se elevou em 25 e 50%, respectivamente para as doses de 100 e 250 μ M de bentazon, em todas as intensidades luminosas avaliadas (Fig. 45).

Os resultados encontrados para a dose de 100 μ M do herbicida clomazone não demonstraram diferença nos parâmetros de trocas gasosas, quando comparados ao controle. Na dose de 250 μ M os valores da Ci sofreram acréscimo de 40%, enquanto que A e g diminuíram 50 e 40%, respectivamente (Fig. 46).

Para o herbicida fomesafen foram verificados resultados semelhantes para as doses as três doses avaliadas, onde redução de 45 e 25%, respectivamente nos valores de A e g foram encontrados (Fig. 47). Para as doses de 100 e 250 μ M, a Ci no escuro sofreu pequena elevação de 10%, porém quando os discos foliares de milho foram expostos à luz, a Ci aumentou 35%, quando comparada ao controle. O herbicida fomesafen na dose de 500 μ M causou aumentos de 22 e 50%, nos índices de Ci, respectivamente para as avaliações no escuro e na luz.

Figura 45. Curva de resposta a luz para os parâmetros trocas gasosas em discos foliares de milho submetidos ao herbicida bentazon em diferentes doses (A) 100 µM e (B) 250 µM. (A = taxa fotossintética líquida em $\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$; g = condutância estomática em $\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$ e Ci = concentração intercelular de CO_2 em $\mu\text{mol mol}^{-1}$) (média $\pm$ erro padrão, $n = 5$). (Detalhes vide material e métodos). Obs.: A dose de 500 µM foi letal aos discos foliares, não permitindo análise.

Figura 46. Curva de resposta a luz para os parâmetros trocas gasosas em discos foliares de milho submetidos ao herbicida clomazone em diferentes doses (A) 100 µM e (B) 250 µM. (A = taxa fotossintética líquida em $\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$; g = condutância estomática em $\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$ e Ci = concentração intercelular de CO_2 em $\mu\text{mol mol}^{-1}$) (média $\pm$ erro padrão, $n = 5$). (Detalhes vide material e métodos). Obs.: A dose de 500 µM foi letal aos discos foliares, não permitindo análise.

Figura 47. Curva de resposta a luz para os parâmetros trocas gasosas em discos foliares de milho submetidos ao herbicida fomesafen em diferentes doses (A) 100 μM , (B) 250 μM e (C) 500 μM . (A = taxa fotossintética líquida em $\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$; g = condutância estomática em $\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$ e Ci = concentração intercelular de CO_2 em $\mu\text{mol mol}^{-1}$) (média $\pm$ erro padrão, $n = 5$). (Detalhes vide material e métodos).

4. DISCUSSÃO

A aplicação de herbicidas no estudo sobre o comportamento fotossintético das plantas se torna de grande valia pelo fato do local de ação destas substâncias ser previamente conhecido.

A fotossíntese é um dos processos de maior importância para as plantas, e um considerável número de moléculas herbicidas interfere em seu metabolismo de maneira direta ou indireta (por exemplo, os inibidores da acetolactato sintase (SOUSA et al., 2012; EULLAFFROY et al., 2009); da mitose e da glutamina sintetase (DAYAN; ZACCARO, 2012)). Em circunstâncias normais, os elétrons derivados a partir da oxidação da água são canalizados através da cadeia de transporte de elétrons fotossintética, a fim de produzir ATP e NADPH. Dentre as moléculas envolvidas na etapa fotoquímica da fotossíntese, as plastoquinonas, desempenham um papel chave na transferência de elétrons. Os dois principais alvos dos herbicidas inibidores da fotossíntese são a interrupção do fluxo de elétrons, através da competição pelo sítio de ligação de Q_B no FSII; e o desvio de elétrons no FSI, através da captura dos elétrons a partir da ferredoxina (DAYAN; ZACCARO, 2012). Porém, diversas moléculas podem interferir indiretamente no metabolismo fotossintético.

O sítio de ligação de Q_B no FSII pode se acoplar facilmente a várias classes de inibidores de FSII, por exemplo, ureias, as triazinas e as bentazotadionas (ROMAN et al., 2007). Bentazon é um herbicida conhecido por inibir o fluxo de elétrons no FSII, porém de maneira diferente dos inibidores típicos (BÖGER et al., 1977), causando muitas vezes injúrias mais leves do que aquelas obtidas pela aplicação de diuron. Esta diferença foi relatada por DAYAN e ZACCARO (2012), onde bentazon causa diminuição inicial de 80% (3h após a aplicação) no fluxo de elétrons da fotossíntese, sendo este parcialmente recuperado para 50% (15h após a aplicação), enquanto a redução encontrada para diuron foi de 100% permanentemente. Outros estudos documentam

recuperaçãoparcialdainibiçãodebentazonna fotossínteseao contrário de outros inibidores deFSII,comprovando que este herbicidano conduz àalteração substancialna atividade dosfotossistemas(BÖGER et al., 1977; MACEDO et al., 2008). Neste experimento o herbicida bentazon causou injúrias ao aparato fotossintético dos discos foliares de soja e milho, o que pode ser observado pela alteração de diversos parâmetros, porém esta injúria não chegou a 100% nem na dose de 500 μ M avaliada.

Um dospapéis fundamentaisdos carotenóidesem plantasé a proteção do aparelho fotossintéticoedefotodegradaçãoporextinguir oexcesso de energialiberadopela fotossíntesesobalta intensidade de luz ou situações de estresse (SANDMANN, 2009). Diversas classes deherbicidasque afetamvários passosna síntese decarotenóidetêm sido desenvolvidas(DUKE; DAYAN, 2011). Entre eles o clomazone é um herbicida que tem como alvo a 1-desoxi-D-xilulose-5-fosfato sintase (DXS), enzima chave navia de fosfatometil-eritritol (MEP), que éresponsável pela síntesedeisoprenóidesplastídicos, como,carotenóides efitol (FERHATOGLU; BARRET, 2006). Uma vez quea inibição daDXSnão afetaos níveis de carotenóides pré-existente,seria de esperar quepouco ou nenhum efeitosobre a fotossíntese das plantas tratadas com clomazone fosse observada durantea duração relativamente curtadesteensaio. Entretanto, diversos parâmetros avaliados foram alterados quando o herbicida clomazone foi aplicado nos discos foliares de soja e milho.

O alvo primário de herbicidasinibidores da síntese de clorofilaé a formacloroplasmáticadaprotoporfirinogênio oxidase(PROTOX) que catalisa a conversão deprotoporfirinogênioaprotoporfirina(DUKE; DAYAN, 2011).Esta enzimaé inibida porum grande número de classesde herbicidas, como, difeniléteres,oxadiazoles, triazolinonaseftalimidias. Este mecanismo de açãoenvolve o acúmulo não reguladodaprotoporfirina,pigmentoaltamentefotodinâmicoque induz a rápida peroxidaçãodas membranasapós a exposiçãoà luz (DAYAN; ZACCARO, 2012). As injúrias observadas nas plantas tratadas com o herbicida fomesafen não são devidas aumainibição diretada fotossíntese, mas sim àdestruição doaparelho fotossintéticoassociada com a peroxidaçãorápida dasmembranas celulares(DAYAN; DUKE, 1997).

Alterações no metabolismo fotossintéticonormal causadaspela ação de herbicidaspodem ser prontamentemedidas pormonitorizaçãoda fluorescência da clorofilaa. A fluorescênciadas clorofilas é um reflexo dafixação de carbono, bem

como do estado de estresse global de uma planta (MAXWELL; JOHNSON, 2000). A fluorescência da clorofila é afetada não apenas pelos herbicidas inibidores da fotossíntese, mas também por diferentes herbicidas dependentes de luz, tais como os inibidores da protoporfirinogênio oxidase (PROTOX) e da biossíntese de carotenóides (HESS, 2000). O herbicida bentazon por interferir diretamente no fluxo de elétrons, induz a fortes alterações na fluorescência da clorofila de plantas, como foi detectado nesta pesquisa. Nas avaliações das curvas OJIP, a fase OJ, reflete a redução de Q_A para Q_A^- ; JI e IP, a redução do conjunto de PQ (STRASSER et al., 1995). Um aumento na intensidade de fluorescência em 2ms (passo J) é geralmente interpretado como evidência de acumulação da fração de Q_A reduzida (STRASSER et al., 1995; LAZAR; ILIK, 1997), possivelmente devido a diminuição do transporte de elétrons para além de Q_A (HALDIMANN; STRASSER, 1999). Desse modo, a alta intensidade dos níveis de fluorescência no passo J (próximos aos obtidos para F_M), encontradas neste experimento para o herbicida bentazon aplicado na dose de $500\mu\text{M}$ nos discos foliares de soja, demonstram que a maioria das Q_A encontram-se completamente reduzidas, pela inibição do transporte de elétrons, sendo assim apenas uma fase de indução única foi observada, já que não ocorre a redução do conjunto de PQ. Na ausência de inibidores de FSII, Q_A pode ser totalmente reduzido apenas quando Q_B^{-2} está presente, que ocorre somente no passo I (ZHU et al., 2005).

Outras pesquisas relatam a observação desta fase de indução única quando utilizado o herbicida DCMU em diferentes espécies (STRASSER et al., 1995; PRASIL; YAAKOUBD, 1999; BUSKOV et al., 2004). A redução no número de elétrons transferidos para a cadeia de transporte foi causada pela redução nos valores de N, observados para a dose de $500\mu\text{M}$ de bentazon. Porém, esta fase de indução única só foi observada para a dose mais elevada de bentazon utilizada nos discos foliares de soja, visto que as doses abaixo de $500\mu\text{M}$ para a soja e as três doses avaliadas para milho, não foram capazes de reduzir todas as Q_A , afetando apenas parcialmente o transporte de elétrons. A ação do herbicida clomazone e fomesafen não resultou em grandes alterações nas curvas OJIP, tanto para os discos foliares de soja e de milho, sendo os parâmetros do milho praticamente inalterados.

Apartir do comportamento polifásico do aumento da fluorescência, os parâmetros do Teste JIP foram obtidos (STRASSER; STRASSER, 1995; STRASSER et al., 2000). Estes parâmetros demonstram alterações no aparato fotossintético que não podem ser visualizadas através da curva OJIP. Os índices de desempenho (PI_{ABS} e $PI_{ABS\text{total}}$) tem sido considerados como mais sensíveis para a detecção e quantificação de estresse em plantas do que o rendimento quântico máximo do FSII (F_V/F_M) (CHRISTEN et al., 2007; OUKARROUM et al., 2007), ou seja, mais consistente para interpretação dos resultados obtida quando se avalia a resposta do fotossistema II para condições estressantes. Isto ocorre, porque os índices de desempenho relacionam a eficiência de absorção, captura e transferência de energia de excitação pelo fotossistema II proporcionando uma visão maior do grau de efeito do ambiente estressante (GONÇALVES; SANTOS JR., 2005). Neste experimento, os parâmetros mais sensíveis a ação dos três herbicidas avaliados, tanto para soja como para milho, foram PI_{ABS} e $PI_{ABS\text{total}}$. Adiminuição nos índices de desempenho, indicam perda de eficiência fotoquímica pelas plantas (THACH et al., 2007).

Na maioria das plantas superiores, ϕ_{P_0} (F_V/F_M) está entre 0,75 a 0,85 (BÒLHAR-NORDENKAMPF et al., 1989) e sob condições controladas este parâmetro é frequentemente proporcional à taxa fotossintética, sendo a redução desta razão um excelente indicador de efeito fotoinibitório quando as plantas estão submetidas ao estresse químico (ARAUS; HOGAN, 1994). Entretanto, neste experimento, mesmo nas doses mais elevadas dos herbicidas o parâmetro ϕ_{P_0} não apresentou alteração em relação aos discos foliares do tratamento controle. Diversos autores também não encontraram variações em ϕ_{P_0} (F_V/F_M) sob diferentes estresses (SILVA; ARRABAÇA, 2004; KAÑA et al., 2004; OKARROUMA et al., 2007; MEHTA et al., 2010; GIORIO et al., 2012). Além disso, o parâmetro DI_0/RC foi alterado apenas pela aplicação do herbicida clomazone, porém em taxas muito pequenas, provavelmente pela tentativa de dissipação de energia em excesso na forma de calor. Estudo realizado por Kaña e colaboradores (2004) demonstrou que o parâmetro TR_0/RC foi cerca de 30% maior nas plantas de cevada cultivadas na presença de $500\mu\text{M}$ de clomazone do que as plantas de cevada do tratamento controle, porém esta alteração não foi verificada para os discos foliares de soja e milho neste estudo.

Uma avaliação mais criteriosa sobre a atividade dos centros de reação permite avaliar a heterogeneidade dos centros de reação do FSII, ou seja, diferenciar os centros redutores de Q_B , considerados ativos, dos centros não-redutores de Q_B , conhecidos como inativos. As unidades com centros de reação ativos mostram uma fluorescência polifásica transiente, com os passos J, I e P distintos e os inativos tem apenas uma fase (semelhante ao passo J), sendo assim as unidades de inativos comportam-se de forma semelhante às unidades ativas que são inibidas com inibidores de FSII (STRASSER; STIRBET, 1998), como pode ser observado nesta pesquisa, para todos os tratamentos avaliados. Nas avaliações do herbicida bentazon foram verificadas reduções nas intensidades de fluorescência do transiente das unidades inativas, o que demonstra que este herbicida afeta a atividade dos centros de reação redutores de Q_B , o que também pode ser observado pela redução nos valores de V_0^* , nos discos foliares de soja e de milho. Já para os demais herbicidas avaliados, não foram obtidas variações relevantes nos transientes das unidades inativas, tanto para os discos foliares de soja como de milho, o que demonstra a pouca influência destes herbicidas sobre a heterogeneidade dos centros de reação do FSII. Relatos de que a quantidade de centros de reação não-redutores de Q_B podem ser alterados sobre a ação de estresse já foram realizados, porém algumas vezes o que ocorre é uma elevação no número de unidades inativas (MEHTA et al., 2011).

A energia luminosa absorvida pelas moléculas de clorofila numa folha pode ser submetida a três destinos distintos: ela pode ser usada na fotossíntese (fotoquímica); o excesso de energia pode ser dissipado na forma de calor; ou pode ser reemitido como fluorescência da clorofila. Estes três processos competem um com o outro, de tal modo que qualquer aumento na eficiência de um irá resultar numa diminuição do rendimento dos outros dois (MAXWELL; JOHNSON, 2000). Através dos dados de cinética de relaxamento, foi possível acompanhar a atividade fotossintética das plantas sob pulsos de luz saturante constantes. Análises da cinética de relaxamento fornecem rápida informação sobre a cinética de transferência de energia de excitação entre os complexos antena e os aceptores de elétrons do FSII (ROELOFS et al, 1992; RENGERT et al, 1995). Nestas avaliações, os discos foliares de soja mostraram-se mais sensíveis que os de milho ao estresse causado pelos três herbicidas avaliados.

Altas intensidades de F_0' foram observadas para a soja e milho tratados com o herbicida bentazon, para os demais herbicidas não foram verificadas alterações em F_0' para nenhuma das espécies avaliadas. Os altos valores de F_0' observados podem ter várias causas, como o aumento do número de centros de reação inativos onde os elétrons não podem ser transferidos para Q_A que está reduzida e, portanto, maior F_0' é medido; outra possibilidade é a baixa transferência de energia de LHCII para o centro de reação do FSII, o que pode ter sido causado pela dissociação do LHCII do núcleo FSII (HAVAUX, 1993). No caso do herbicida bentazon, o motivo do aumento de F_0' , provavelmente tenha sido devido ao aumento dos centros de reação inativos, pelo fato das Q_A estarem reduzidas e indisponíveis para receber elétrons, corroborando com os dados de fluorescência transiente encontrados para o bentazon neste estudo. Para os demais herbicidas foi verificada insensibilidade de F_0' , provavelmente pelo fato destes não inibirem diretamente o fluxo de elétrons, ou seja, não ocorre a inativação dos centros de reação e sim alteração no metabolismo fotossintético como reação a ação destas moléculas. Neste trabalho, também foi observado para o herbicida bentazon valores iniciais mais elevados para F_M' , entretanto estes valores decresceram durante a aplicação dos pulsos de luz saturante, o que também pode indicar a inativação dos centros de reação do FSII, confirmando o que foi encontrado para F_0' .

É sugerido que a acumulação de centros de reação inativos está associado com o aumento da eficiência de dissipação de luz absorvida na forma de calor (KALAJI et al., 2011), porém isto deveria ser refletido em valores significativamente mais elevados dos parâmetros que indicam a eficácia dos processos não-fotoquímicos de excitação, como por exemplo Dl_0/RC e ϕ_{D_0} , o que não foi verificado no teste JIP avaliado neste estudo.

Outra intensidade de fluorescência fortemente elevada pela ação do herbicida bentazon foi F_S . Diversos autores relatam que F_S é um parâmetro sensível ao estresse em plantas C_3 , C_4 e CAM (CEROVIC et al., 1996; FLEXAS et al., 2000). A intensidade de fluorescência no estado estacionário (F_S), é uma função da competição entre a energia de excitação fotoquímica e não-fotoquímica absorvida pelos complexos de colheita de luz (SCHREIBER et al., 1998). O aumento desta competição, causado pela ação do herbicida, é demonstrado pela elevação de F_S , aqui mencionada, provavelmente devido ao não- aproveitamento de parte da energia que chegava ao complexo-antena, uma vez que estes bloquearam o fluxo de

elétrons no FSII no nível da proteína D₁. Frankart e colaboradores (2003) já haviam observado elevação de F_S em plantas submetidas à ação de atrazina (herbicida inibidor de FSII). Esta elevação nos valores de F_S também foi observada para as duas doses mais elevadas de clomazone aplicado nos discos foliares de soja, só que neste caso o motivo provável tenha sido a redução na quantidade de energia aproveitada pela planta para realização dos processos fotoquímicos, como fixação de CO₂ e redução de NADP⁺. Para os discos foliares de milho este parâmetro foi insensível à ação do herbicida bentazon.

Normalmente, a quantidade total de fluorescência da clorofila é muito pequena, e grandes porções da luz absorvida são usadas para conduzir a fotossíntese, que é referido como qP, ou são dissipadas na forma de calor, em extinção de fluorescência, que é denominado NPQ ou qN (RALPH; GADEMANN, 2005). Logo que a energia absorvida pelos pigmentos vegetais excede o requisito para a atividade fotoquímica, ou que por algum estresse ocorra excesso de energia acumulada nos centros de reação do FSII, mecanismo rápido de dissipação de calor é acionado, a fim de impedir a produção de espécies reativas de oxigênio (SZABO et al., 2005; EBERHARD et al., 2008). Este mecanismo é conhecido como não fotoquímico (NPQ ou qN) de fluorescência da clorofila porque compete com a fotoquímica para extinguir a pouca energia que a clorofila excitada pode emitir como fluorescência (DEMMIG-ADAMS, 2003; KRAUSE; JAHNS, 2003; HOLT et al., 2004; BAKER, 2008). NPQ e qN representam a dissipação da energia dos fótons em excesso, evitando danos à via fotoquímica, antes que a energia seja acumulada como intermediários reativos na cadeia fotossintética (RALPH et al., 2002).

Nas duas espécies tratadas com o herbicida clomazone houve um grande aumento nos valores de NPQ e qN, o que representa maior dissipação não-fotoquímica da energia absorvida pelos fótons. Nos discos foliares de soja, o herbicida bentazon também causou elevação nos índices de qN e NPQ, porém inferiores as encontradas para o clomazone. Kim e colaboradores (1999), não verificaram alteração em qN para tecidos tratados com o herbicida diuron. No entanto, nos discos foliares de milho ocorreu decréscimo principalmente nos valores de NPQ quando submetidos à ação de bentazon. Este decréscimo de NPQ também foi observado em estudos realizados com *Lemma minor* exposta ao herbicida atrazina (FRANKART et al., 2003). Geralmente, a sobre-regulação de NPQ é pelo menos bifásica, com um componente rápido que reage em segundos, e um

componente lento com cinética de ativação completa em escalas de minutos (MÜLLER et al., 2001; GROUNOVA et al., 2009).

O componente rápido é controlado por um gradiente de pH na membrana dos tilacóides, enquanto que a epoxidação de pigmentos do ciclo das xantofilas é responsável pela fase mais lenta de $E(LAVAUD, 2007)$. Caso a absorção de luz exceda a capacidade para a fixação de CO_2 , uma ΔpH nos tilacóides é construída pelo transporte de elétrons da fotossíntese. A acidificação do lúmen ativa a conversão enzimática de um carotenóide, violaxantina em zeaxantina, que é um supressor dos estados de clorofila "triplet"s (MÜLLER et al., 2001). Esta variação na regulação de NPQ pode ser o fator responsável pela forma como as duas espécies responderam diferentemente à ação do herbicida bentazon. Para o herbicida fomesafen, alterações pouco significativas de q_N e NPQ foram verificadas para as duas espécies.

Valores de rendimento quântico fotoquímico efetivo (F_V'/F_M') muito inferiores a aqueles encontrados para rendimento quântico fotoquímico máximo (F_V/F_M) demonstram que os discos foliares de soja e milho não foram capazes de manter sua atividade fotossintética próxima ao potencial das folhas, quando submetidos à ação de bentazon e clomazone. Esta redução na atividade fotossintética se deve à acentuada redução da eficiência fotoquímica (ϕ_{FSII}), demonstrada também pelo coeficiente de extinção fotoquímico (q_P), observados nestas avaliações. Redução destes parâmetros em situações de estresse foram observadas em diversos estudos (CALATAYUD; BARRENO, 2004; PEI; BIÉ, 2007). Estes efeitos foram mais intensos nas doses mais elevadas de bentazon e clomazone. Para fomesafen ocorreu suave declínio na eficiência fotoquímica, porém sem causar redução no rendimento quântico fotoquímico efetivo dos discos foliares de soja e milho.

Curvas de resposta à luz são amplamente utilizadas para a caracterização quantitativa da luz-dependência da atividade fotossintética de organismos fotoautotróficos (HENLEY, 1993). Tradicionalmente, as curvas de luz são baseadas na medição do estado estacionário de taxas de fotossíntese sob uma gama de níveis de irradiância relevantes, informando assim sobre a atividade fotossintética que pode ser esperada sob uma irradiância determinada, sob condições constantes (CRUZ; SERÓDIO, 2008).

As informações contidas nas curvas de resposta à luz são geralmente resumidas por um pequeno número de parâmetros fisiologicamente significativos. ϕ_{FSII} mede a

proporção de luz absorvida pela clorofila associada ao FSII usada na fotoquímica. Como tal, pode dar uma medida da taxa de transporte de elétrons linear (ETR) e uma indicação da fotossíntese global (FU et al., 2012). Os resultados de qP dá uma indicação da proporção de centros de reação abertos no FSII, e ϕ_{FSII} é a proporção de energia absorvida usada na fotoquímica (MAXWELL; JOHNSON, 2000). No entanto, existe uma correlação estreita entre os dois parâmetros. Esta correlação foi verificada em todas as avaliações realizadas nesta pesquisa. A ação dos herbicidas causou redução semelhante em ϕ_{FSII} e qP , sendo esta mais acentuada para o primeiro parâmetro. Os discos foliares de soja foram mais sensíveis à ação das três moléculas herbicidas do que os discos foliares de milho, e para as duas espécies o herbicida bentazon foi o que resultou em danos mais significativos. Além disso, para todas as avaliações, foi observado um declínio gradual em ϕ_{FSII} e qP à medida que a intensidade de luz foi aumentada. Em geral, isto ocorre devido à fotoinibição, causada pelo excesso de energia (FU et al., 2012).

O parâmetro mais sensível aos herbicidas nas avaliações das curvas de luz foi a taxa de transporte de elétrons (ETR). Como ETR é função de ϕ_{FSII} , reduções deste parâmetro foram observadas, o que indica redução no transporte de elétrons linear da fotossíntese quando os discos foliares de soja e milho foram submetidos aos tratamentos com bentazon, clomazone e fomesafen. Entretanto, diferentemente de ϕ_{FSII} e qP , ETR em função da irradiância mostrou uma curva clássica de uma curva de luz, com um aumento linear onde a luz foi limitante seguido por um patamar, onde a fotossíntese ficou limitada (RALPH; GADEMANN, 2005). Isto ocorre, porque nas primeiras emissões de luz, os processos de transporte de elétrons estão sendo estabelecidos (IHLEN et al., 2010), ocasionando um aumento significativo em relação ao ETR no escuro. DAYAN e ZACCARO (2012) verificaram forte efeito de bentazon e sulfentrazone (inibidor de PROTOX) na redução de ETR de plantas de pepino na presença de luz, porém para clomazone nenhum efeito foi observado. Em contrapartida, a aplicação de herbicida clomazone afetou a fotossíntese de plantas de cevada (*Hordeum vulgare* L.), reduzindo os níveis de clorofila e carotenóides, que diminuíram a taxa de transporte de elétrons (KAÑA et al., 2004).

A relação ϕ_{FSII}/ϕ_{CO_2} , forneceu informações importantes sobre a ação das moléculas de herbicidas nas duas espécies avaliadas. Na soja, embora o herbicida bentazon tenha reduzido consideravelmente os valores de ϕ_{FSII} , a proporção de

equivalentes de elétrons resultantes da atividade fotoquímica do FSII que são usados para a assimilação de CO₂ em folhas é consideravelmente a mesma do tratamento controle. Já para os herbicidas clomazone e fomesafen a taxa de transporte de elétrons através de FSII foi considerada excessiva em relação às taxas observadas de assimilação de CO₂. Rotas alternativas para os elétrons além da assimilação de CO₂ devem estar operando para manter as altas relações $\varphi_{\text{FSII}}/\varphi_{\text{CO}_2}$ encontradas.

A dissipação do excesso de energia pode continuar através de processos de transporte de elétrons, mesmo quando, por qualquer razão, a assimilação líquida de CO₂ é reduzida. Estes processos incluem a fotorespiração (WU et al., 1991), a reação de Mehler (ASADA, 1999) e o fluxo de elétrons cíclico em torno de FSI (KATONA et al., 1992) e FSII (ALLAKHVERDIEV et al., 1997). Para os discos foliares de milho a razão $\varphi_{\text{FSII}}/\varphi_{\text{CO}_2}$ foi mantida, para todos os herbicidas avaliados, próxima a 12, ou seja, sem alterações em relação ao controle. Isto sugere que o mecanismo que ocorre nos discos foliares de soja submetidos à ação de clomazone e fomesafen (para manter as altas relações $\varphi_{\text{FSII}}/\varphi_{\text{CO}_2}$) seja a fotorespiração. Isto justificaria a manutenção da relação $\varphi_{\text{FSII}}/\varphi_{\text{CO}_2}$, próxima a 12, encontrada para as plantas de milho tratadas com os herbicidas clomazone e fomesafen, visto que o milho possui metabolismo fotossintético C₄, apresentando típica anatomia Kranz, que proporciona assimilação primária de carbono nas células do mesófilo e redução do carbono pela fotossíntese nas células da bainha (HATTERSLEY, 1984), resultando em altas concentrações de CO₂ nas células, o que reduz a níveis insignificativos as taxas de fotorespiração, em comparação as espécies C₃, justificando assim os resultados encontrados neste trabalho.

O emprego de caracteres fisiológicos referentes às trocas gasosas é de grande importância na avaliação da atividade fotossintética das plantas expostas a diferentes estresses. Todos os tratamentos avaliados nesta pesquisa resultaram em declínio nos valores da taxa assimilação líquida (*A*) dos discos foliares de soja e milho, em relação aos obtidos para o tratamento controle. Além disso, ao longo do aumento das intensidades luminosas avaliadas também houve redução de *A*. Embora a luz seja a fonte de energia para o processo fotossintético e, obviamente, o pré-requisito essencial para a vida na Terra, o excesso desse recurso pode ter como

consequência a redução ou mesmo a inibição da assimilação fotossintética de CO₂ (LONG et al., 1994).

O excesso de luz pode causar destruição fotooxidativa do aparato fotossintético, ou seja, nessa condição, a energia luminosa não é utilizada no processo fotossintético. Este processo de diminuição da eficiência na incorporação do carbono pela elevada energia luminosa é denominado fotoinibição (LONG et al., 1994) e pode ocorrer mesmo na ausência de qualquer outro tipo de estresse (ÖGREEN, 1988). Isto foi verificado nesta pesquisa, onde inclusive as plantas do tratamento controle de soja e milho demonstraram redução de *A* com o aumento da radiação.

A condutância estomática (*g*) apresentou padrões similares ao da taxa de fotossíntese, na maioria dos tratamentos avaliados, sugerindo que a queda da assimilação líquida de CO₂ esteja relacionada com o fechamento parcial dos estômatos. As correlações entre a assimilação de CO₂ e a condutância estomática podem ser explicadas como uma função da restrição da fixação de CO₂ por alterações no metabolismo fotossintético das plantas (SILVA et al., 2010). Em conjunto com a redução de *A* e *g* gerada pela ação dos herbicidas nos discos foliares de soja e milho, a concentração intracelular de CO₂ foi elevada em todos os tratamentos avaliados, provavelmente devido ao fechamento estomático e redução na taxa de assimilação líquida causada pela situação de estresse.

5. CONCLUSÃO

As avaliações de fluorescência transiente e modulada, embora sejam técnicas distintas, fornecem informações complementares sobre a atividade fotossintética dos discos foliares de soja e milho expostas a ação de bentazon, clomazone e fomesafen.

O herbicida bentazon é o que mais afeta as intensidades de fluorescência da clorofila e os demais parâmetros obtidos através das duas técnicas utilizadas, por agir diretamente na fotossíntese, bloqueando o transporte de elétrons.

Os herbicidas clomazone e fomesafen pouco alteraram os dados referentes à fluorescência transiente, sendo os parâmetros de fluorescência modulada e trocas gasosas mais sensíveis à sua ação. Os resultados obtidos para o herbicida clomazone fornecem informações importantes sobre o diferente efeito da fotoinibição em plantas com metabolismo C_3 e C_4 .

Os índices de desempenho PI_{ABS} e $PI_{ABS\ total}$ foram os parâmetros de fluorescência transiente mais sensíveis à ação de bentazon, clomazone e fomesafen. O rendimento quântico máximo do FSII (F_V/F_M) foi insensível à ação dos herbicidas, não sendo um bom indicador do estresse causado por estas moléculas.

Nas análises de fluorescência modulada, os parâmetros mais sensíveis à ação de bentazon, clomazone e fomesafen foram F_S , F_M' , ETR e ϕ_{PSII} , sendo bons indicadores de sensibilidade à ação de herbicidas.

O milho é menos sensível que a soja aos herbicidas bentazon, clomazone e fomesafen, sugerindo que plantas com metabolismo C_4 , embora sofram com a ação dos herbicidas, possuem maior capacidade de tolerância que as espécies com metabolismo C_3 .

6. REFERÊNCIAS

ADAMSKI, J. M.; PETERS, J. A.; DANIELOSKIC, R.; BACARIN, M. A. Excess iron-induced changes in the photosynthetic characteristics of sweet potato. **Journal of Plant Physiology**, v. 168, p. 2056–2062, 2011.

ALLAKHVERDIEV, S. I.; KLIMOV, V. V.; CARPENTIER, R. Evidence for the involvement of cyclic electron transport in the protection of photosystem II against photoinhibition: Influence of a new phenolic compound. **Biochemistry**, v. 36, p. 4149-4154, 1997.

ALLAKHVERDIEV, S. I. Recent progress in the studies of structure and function of photosystem II. **Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology**, v. 104, p. 1–8, 2011.

ARAUS, J. L.; HOGAN, K. P. Comparative leaf structure and patterns of photoinhibition of the neotropical palms. *Scheelea zonensis* and *Socratea durissima* growing in clearing and forest understory during the dry season in Panama. **American Journal of Botany**, v. 81, p. 726-738, 1994.

ARMEL, G.R.; RARDON, P. L.; McCORMICK, M.C.; FERRY, N.M. Differential response of several carotenoid biosynthesis inhibitors in mixture with atrazine. **Weed Technology**, v. 21, p. 947–953, 2007.

ASADA, K. The water-water cycle in chloroplasts: scavenging of active oxygens and dissipation of excess photons. **Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology**, v. 50, p. 601-639, 1999.

BAKER, N. R. Chlorophyll Fluorescence: A Probe of Photosynthesis In Vivo. **Annual Review Plant Biology**, v. 59, p. 89–113, 2008.

BARBER, J. The structure of photosystem I. **Nature Structural Biology**, v.8, p. 77-579, 2001.

BASSHAM, J.A. Mapping the carbon reduction cycle: a personal retrospective. **Photosynthesis Research**, v. 76, p. 35–52, 2003.

BEALE, S. I.; WEINSTEIN, J. D. Tetrapyrrole metabolism in photosynthetic organisms. In: DAILEY, H. A. (Ed.), **Biosynthesis of Heme and Chlorophylls**, McGraw-Hill, New York, p. 287-391, 1990.

BECERRIL, J. M.; DUKE, S.O. Protoporphyrin IX correlates with activity of photobleaching herbicides. **Plant Physiology**, v. 90, p. 1175–1181, 1989.

BÖGER, P.; BEESE, B.; MILLER, R. Long-term effects of herbicides on the photosynthetic apparatus II: Investigation on bentazone inhibition. **Weed Research**, v. 17, p. 61–67, 1977.

BOLHAR-NORDENKAMPF, H. R.; LONG, S. P.; BAKER, N. R.; OQUIST, G.; SCHREIBER, U.; LECHNER, E. G. Chlorophyll fluorescence as a probe of the photosynthetic competence of leaves in the field: a review of current instrumentation. **Functional Ecology**, v. 3, p. 497–514, 1989.

BUCHANAN, B. B.; GRUISSEM, W.; JONES, R. L. **Biochemistry and molecular biology of plants**. Maryland: American society of Plant Physiologists, 2000. 1367p.

BUKHOV, N.G.; EGOROVA, E.A.; GOVINDACHARY, S.; CARPENTIER, R. Changes in polyphasic chlorophyll a fluorescence induction curve upon inhibition of donor or acceptor side of photosystem II in isolated thylakoids. **Biochimica et Biophysica Acta**, v. 1657, p. 121–130, 2004.

BUONASERA, K; LAMBREVA, M; REA, G; TOULOUPAKIS, E.; GIARDI, M. T. Technological applications of chlorophyll a fluorescence for the assessment of environmental pollutants **Analytical and Bioanalytical Chemistry**, v. 401, p. 1139–1151, 2011.

CAEMMERER, S.; FARQUHAR, G.D. Some relationships between the biochemistry of photosynthesis and the gas-exchange of leaves, **Planta**, v. 153, p. 376–387, 1981.

CAKMAK, I.; DRAGANA, S.; HORST, M. Activities of hydrogen peroxide-scavenging enzymes in germinating wheat seeds. **Journal of Experimental Botany**, v. 44, p. 127–132, 1993.

CALATAYUD, A.; BARRENO, E. Response to ozone in two lettuce varieties on chlorophyll a fluorescence, photosynthetic pigments and lipid peroxidation. **Plant Physiology and Biochemistry**, v. 42, p. 549-555, 2004.

CALATAYUD, A.; ROCA, D.; MARTÍNEZ, P. F. Spatial-temporal variations in rose leaves under water stress conditions studied by chlorophyll fluorescence imaging. **Plant Physiology and Biochemistry**, v. 44, p. 564–573, 2006.

CATUNDA, M. G.; FREITAS, S. P.; OLIVEIRA, J. G.; SILVA, C. M. M. Efeitos de herbicidas na atividade fotossintética e no crescimento de abacaxi (*Ananas comosus*). **Planta Daninha**, Viçosa-MG, v. 23, p. 115-121, 2005.

CEROVIC, Z. G.; GOULAS, Y.; GORBUNOV, M.; BRIANTAIS J. M.; CAMENEN, L.; MOYA, I. Fluorescence sensing of water stress in plants: diurnal changes of the mean lifetime and yield of chlorophyll fluorescence, measured simultaneously and at distance with t-LID-AR and modified PAM fluorometer in maize, sugar beet and kalanchoe. **Remote Sensing of Environment**, v. 58, p. 311–321, 1996.

CHALIFOUR, A.; SPEAR, P. A.; BOILY, M.H.; DEBLOIS, C.; GIROUX, I.; DASSILVA, N.; JUNEAU, P. Assessment of toxic effects of pesticide extracts on different green algal species by using chlorophyll a fluorescence. **Toxicological and Environmental Chemistry**, v. 91, p. 1315-1329, 2009

CHEN, S.; YIN, C.; DAI, X.; QIANG, S.; XU, X. Action of tenuazonic acid, a natural phytotoxin, on photosystem II of spinach. **Environmental and Experimental Botany**, v. 62, p. 279–289, 2008.

CHRISTEN, D.; SCHÖNMANN, S.; JERMINI, M.; STRASSER, R.J.; DÉFAGO, G. Characterization and early detection of grapevine (*Vitis vinifera*) stress responses to esca disease by in situ chlorophyll fluorescence and comparison with drought stress. **Environmental and Experimental Botany**, v. 60, p. 504-514, 2007.

CRUZ, S.; SERÔDIO, J. Relationship of rapid light curves of variable fluorescence to photoacclimation and non-photochemical quenching in a benthic diatom. **Aquatic Botany**, v. 88, p. 256–264, 2008.

DAYAN, F. E.; DUKE, S. O. Phytotoxicity of protoporphyrinogen oxidase inhibitors: phenomenology, mode of action, mechanisms of resistance. In: ROE, R. M.; BURTON, J. D.; KUHR, R. J. (Eds.), **Herbicide Activity: Toxicology, Biochemistry, Molecular Biology**, IOS Press, Washington, DC, p. 11–35, 1997.

DAYAN, F. E.; ZACCARO, M. L. M. Chlorophyll fluorescence as a marker for herbicide mechanisms of action. **Pesticide Biochemistry and Physiology**, v. 102 p. 189–197, 2012.

DEMMIG-ADAMS, B. Linking the xanthophyll cycle with thermal energy dissipation. **Photosynthesis Research**, v. 76, p. 73–80, 2003.

DE RONDE, J. A.; CRESS, W. A.; KRÜGER, G. H. J.; STRASSER, R. J.; VAN STADEN, J. Photosynthetic response of transgenic soybean plants, containing an Arabidopsis P5CR gene, during heat and drought stress. **Journal of Plant Physiology**, v. 161, p. 1211–1224, 2004.

DUKE, S. O.; DAYAN, F. E. Bioactivity of herbicides. In: MURRAY, M. Y. (Ed.), **Comprehensive Biotechnology**, New York: Elsevier, 2^o ed., v. 04, p. 23–35, 2011.

EARL, H. J.; TOLLENAAR, M. Relationship between thylakoid electrontransport and photosynthetic uptake in leaves of three maize (*Zea mays*L.) hybrids.

Photosynthesis Research, v. 58, p. 245-257, 1998.

EBERHARD, S.; FINAZZI, G.; WOLLMAN, F. A. The dynamics of photosynthesis.

Annual Review of Genetics, v. 42, p. 463–515, 2008.

EDWARDS, G.E.; BAKER, N. R. Can CO₂ assimilation in maize leaves be predicted accurately from chlorophyll fluorescence analysis? **Photosynthesis Research**, v. 37, p. 89–102, 1993.

EULLAFFROY, P.; FRANKART, C.; AZIZ, A.; COUDERCHET, M.; BLAISE, C. Energy fluxes and driving forces for photosynthesis in *Lemna minor* exposed to herbicides. **Aquatic Botany**, v. 90, p. 172–178, 2009.

FARALONI, C.; CUTINO, I.; PETRUCCELLI, R.; LEVA, A. R.; LAZZERI, S.; TORZILLO, G. Chlorophyll fluorescence technique as a rapid tool for in vitro screening of olivecultivars (*Olea europaea* L.) tolerant to drought stress.

Environmental and Experimental Botany, v. 73, p. 49–56, 2011.

FARQUHAR, G.D.; CAEMMERER, S.; BERRY, J.A. A biochemical model of photosynthetic CO₂ assimilation in leaves of C₃ species. **Planta**, v. 149, p. 78-90, 1980.

FERHATOGLU, Y.; BARRET, M. Studies of clomazone mode of action. **Pesticide Biochemistry and Physiology**, v. 85, p. 7-14, 2006.

FLEXAS, J.; BRIANTAIS, J. M.; CEROVIC, Z.; MEDRANO, H.; MOYA, I. Steady-state and maximum chlorophyll fluorescence responses to water stress in grapevine leaves: a new remote sensing system. **Remote Sensing of Environment**, v. 73, p. 283–297, 2000.

FORCE, L.; CRITCHLEY, C.; VAN RENSEN, J.J.S. New fluorescence parameters for monitoring photosynthesis in plants. **Photosynthesis Research** v.78, p. 17–33, 2003.

FORMAGGIO, E.; CINQUE, G.; BASSI, R. Functional architecture of the major light-harvesting complex from higher plants. **Journal of Molecular Biology**, v.314, p. 1157–1166, 2001.

FRANKART, C.; EULLAFFROY, P.; VERNET, G. Comparative effects of four herbicides on non-photochemical fluorescence quenching in *Lemna minor*. **Environmental and Experimental Botany**, v. 49, p. 159-168, 2003.

FRIDLAND, L.E.; SCHEIBE, R. Controlled distribution of electrons between acceptors in chloroplasts: a theoretical consideration. **Biochimica et Biophysica Acta**, v. 1413, p. 31-42, 1999.

FU, W.; LI, P.; WU, Y. Effects of different light intensities on chlorophyll fluorescence characteristics and yield in lettuce. **Scientia Horticulturae**, v. 135, p. 45–51, 2012.

FUKUYAMA, K. Structure and function of plant-type ferredoxins. **Photosynthesis Research**, v.81, p. 289–301, 2004.

FURBANK, R.T.; HATCH, M.D. Mechanism of C₄ photosynthesis: the size and composition of the inorganic carbon conjunto in bundle sheath cells. **Plant Physiology**, v. 85, p. 958–964, 1987

GENTY, B.; BRIANTAIS, J. M.; BAKER, N.R. The relationship between the quantum yield of photosynthetic electron transport and quenching of chlorophyll fluorescence. **Biochimica et Biophysica Acta**, v. 990, p. 87-92, 1989.

GIORIO, P.; GIORIO, G.; GUADAGNO, C. R.; CELLINI, F.; STIGLIANI, L. A.; D'AMBROSIO, C. Carotenoid content, leaf gas-exchange, and non-photochemical

quenching in transgenic tomato overexpressing the carotene hydroxylase 2 gene (CrtR-b2). **Environmental and Experimental Botany**, v. 75, p. 1-8, 2012.

GOLTSEV, V.; YORDANOV, I., Mathematical model of prompt and delayed chlorophyll fluorescence induction kinetics. **Photosynthetica**, v. 33, p. 571–586, 1997.

GONÇALVES, J. F. C.; SANTOS JR., U. M. Utilization of the chlorophyll a fluorescence technique as a tool for selecting tolerant species to environments of high irradiance. **Brazilian Journal Plant Physiology**, v. 17, p. 307-313, 2005.

GONÇALVES, J. F. C.; SILVA, C. E.; GUIMARÃES, D. G.; BERNARDES, R. Análise dos transientes da fluorescência da clorofila a de plantas jovens de *Carapa guianensis* e de *Dipteryx odorata* submetidas a dois ambientes de luz. **Acta Amazonica**, v. 40, n. 1, p. 89 – 98, 2010.

GORBE, E.; CALATAYUD, A. Applications of chlorophyll fluorescence imaging technique in horticultural research: A review. **Scientia Horticulturae**, v. 138, p. 24–35, 2012.

GOSS, R.; JAKOB, T. Regulation and function of xanthophylls cycle-dependent photoprotection in algae. **Photosynthesis Research**, v. 106, p. 103–122, 2010.

GOVINDJEE; KERN, J. F.; MESSINGER, J.; WHITMARSH, J. **Photosystem II**. eLS. 2010. URL: www.els.net

GROUNEVA, I.; JAKOB, T.; WILHELM, C.; GOSS, R. The regulation of xanthophyll cycle activity and of non-photochemical fluorescence quenching by two alternative electron flows in the diatoms *Phaeodactylum tricorutum* and *Cyclotella meneghiniana*. **Biochimica et Biophysica Acta**, v. 1787, p. 929-938, 2009.

GUO, Y.; TAN, J. Modeling and simulation of the initial phases of chlorophyll fluorescence from Photosystem II. **BioSystems**, v. 103, p. 152–157, 2011.

GUSKOV, A.; KERN, J.; GABDULKHAKOV, A.; BROSER, M.; ZOUNI, A.; SAENGER, W. Cyanobacterial photosystem II at 2.9-angstrom resolution and the role of quinones, lipids, channels and chloride. **Nature Structural & Molecular Biology**, v. 16, p. 334–342, 2009.

HALDIMANN, P.; STRASSER, R. J. Effects of anaerobiosis as probed by the polyphasic chlorophyll a fluorescence rise kinetic in pea (*Pisum sativum* L.). **Photosynthesis Research**, v. 62, p. 67–83, 1999.

HATTERSLEY, P.W. Characterization of C₄ type leaf anatomy in grasses (Poaceae). Mesophyll: Bundle sheath area ratios. **Annals of Botany**, v. 53, p. 163–179, 1984.

HAUPT-HERTING, S.; FOCK, H.P. Oxygen exchange in relation to carbon assimilation in water-stressed leaves during photosynthesis. **Annals of Botany**, v. 89, p. 851–859, 2002.

HAVAUX, M. Rapid photosynthetic adaptation to heat stress triggered in potato leaves by moderately elevated temperatures. **Plant Cell and Environment**, v. 16, p. 461–467, 1993.

HENLEY, W. J. Measurement and interpretation of photosynthetic light-response curves in algae in the context of photoinhibition and diel changes. **Journal of Phycology**, v. 29, p. 729–739, 1993.

HERBICIDE RESISTANCE ACTION COMMITTEE [HRAC]. **Classification of Herbicides According to Mode of Action**. Disponível em: www.plantprotection.org/hrac/. Acessado em: 15/06/2012.

HESS, F. D. Light-dependent herbicides: an overview. **Weed Science**, v. 48, p. 160–170, 2000.

HOLT, N. E.; FLEMING, G. R.; NIYOGI, K. K. Toward an understanding of the mechanism of nonphotochemical quenching in green plants. **Biochemistry**, v. 43, p. 8281–8289, 2004.

HUGIE, J. A.; BOLLERO, G. A.; TRANEL, P.J.; RIECHERS, D. E. Defining the requirements for synergism between mesotrione and atrazine in redroot pigweed (*Amaranthus retroflexus*). **Weed Science**, v. 56, p.265–270, 2008.

IHNKEN, S.; EGGERT, A.; BEARDALL, J. Exposure times in rapid light curves affect photosynthetic parameters in algae. **Aquatic Botany**, v. 93, p. 185–194, 2010.

JACOBS, J. M.; JACOBS, N. J. Porphyrin accumulation and export by isolated barley (*Hordeum vulgare*) plastids. **Plant Physiology**, v. 101, p. 1181–1187, 1993.

JOLY, D.; CARPENTIER, R. Sigmoidal reduction kinetics of the photosystem II acceptor side in intact photosynthetic materials during fluorescence induction. **Photochemical & Photobiological Sciences**, v. 8, p. 167–173, 2009.

JUNEAU, P.; LAWRENCE, J.E.; SUTTLE, C.A.; HARRISON, P.J. Effects of viral infection on photosynthetic processes in the bloom-forming alga *Heterosigma akashiwo*. **Aquatic Microbial Ecology**, v. 3, p. 9-17, 2003.

JUNEAU, P.; GREEN, B. R.; HARRISON, P. J. Simulation of Pulse-Amplitude-Modulated (PAM) fluorescence: Limitations of some PAM-parameters in studying environmental stress effects. **Photosynthetica**, v. 43, p. 75-83, 2005.

KAŇA, R.; SPUNDOV, M.; ÍLIK, P.; LAZÁR, D; KLEM, K; TOMEK, P.; NAUS, J.; PRASIL, O. Effect of herbicide clomazone on photosynthetic processes in primary barley (*Hordeum vulgare* L.) leaves. **Pesticide Biochemistry & Physiology**, v. 78, p. 161-170, 2004.

KALAJI, H. M.; GOVINDJEE; BOSAC, K.; KOSCIELNIAK, J.; ZUK-GOŁASZEWSKA, K. Effects of salt stress on photosystem II efficiency and CO₂ assimilation of two Syrian barley landraces. **Environmental and Experimental Botany**, v. 73, p. 64–72, 2011.

KARPLUS, P.A.; DANIELS, M.J.; HERRIOT, J.R. Atomic structure of ferredoxina-NADP reductase: Prototype for a structurally novel flavoenzyme family. **Science**, v. 251, p. 60-66, 1991.

KATONA, E.; NEIMANIS, S.; SCHÖNKNECHT, G.; HEBER, U. Photosystem I - dependent cyclic electron transport is important in controlling photosystem II activity in leaves under conditions of water stress. **Photosynthesis Research**, v. 34, p. 449–464, 1992.

KAUTSKY, H.; HIRSCH, A. Neue versuche zur kohlenaureassimilation. **Naturwissenschaften**, v.19, p. 964–1964, 1931.

KERN, J.; GUSKOV, A. Lipids in photosystem II: Multifunctional cofactors. **Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology**, v. 104, p. 19–34, 2011.

KIM, J. S.; JUNG, S.; HWANG, I. T.; CHO, K. Y. Characteristics of chlorophyll a fluorescence induction in cucumber cotyledons treated with diuron, norflurazon, and sulcotrione. **Pesticide Biochemistry and Physiology**, v. 65, p. 73-81, 1999.

KRAUSE, G. H.; JAHNS, P. Pulse amplitude modulated chlorophyll fluorometry and its application in plant science. In: GREEN, B. R.; PARSON, W. W. (Eds.), **Light - Harvesting Antennas in Photosynthesis**, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, Kluwer, p. 373–399, 2003.

KRAUSE, G.H.; WEIS, E. Chlorophyll fluorescence and photosynthesis: the basis. **Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology**, v. 42, p. 313–349, 1991.

KRIEGER-LISZKAY, A.; FUFUZAN, C.; TREBST, A. Singlet oxygen production in photosystem II and related protection mechanism. **Photosynthesis Research**, v. 98, p. 551–564, 2008.

KÜLHEIM, C.; AGREN, J.; JANSSON, S. Rapid regulation of light harvesting and plant fitness in the field. **Science**, v. 297, p. 91–93, 2002.

- LAIBLE, P. D.; ZIPFEL, W.; OWENS, T. G. Excited state dynamics in chlorophyll-based antennae: the role of transfer equilibrium. **Biophysical Journal**, v. 66, p. 844-860, 1994.
- LAVAUD, J. Fast regulation of photosynthesis in diatoms: mechanisms, evolution and ecophysiology. **Functional Plant Science & Biotechnology**, v. 1, p. 267-287, 2007.
- LAZÁR, D.; ILÍK, P. High-temperature induced chlorophyll fluorescence changes in barley leaves: comparison of the critical temperatures determined from fluorescence induction and from fluorescence temperature curve. **Plant Science**, v. 124, p. 159-164, 1997.
- LEEGOOD, R.C. C4 photosynthesis: principles of CO₂ concentration and prospects for introduction into C3 plants. **Journal of Experimental Botany**, v. 53, p. 581-590, 2002.
- LOLL, B.; KERN, J.; SAENGER, W.; ZOUNI, A.; BIESIADKA, J. Towards complete cofactor arrangement in the 3.0 angstrom resolution structure of photosystem II. **Nature**, v. 438, p. 1040-1044, 2005.
- LONG, S. P.; HUMPHRIES, S.; FALKOWSKI, P. G. Photoinhibition of photosynthesis in nature. **Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology**, v. 45, p. 633-662, 1994.
- MACEDO, R. S.; LOMBARDI, A. T.; OMACHI, C. Y.; RORIG, L.R. Effects of the herbicide bentazon on growth and photosystem II maximum quantum yield of the marine diatom *Skeletonema costatum*. **Toxicology In Vitro**, v. 22, p. 716-722, 2008.
- MARTINAZZO, E. G.; PERBONI, A. T.; FARIAS, M. E.; BIANCHI, V. J.; BACARIN, M. A. Photosynthetic activity in the rootstock of hybrid peach trees submitted to water restriction and flooding. **Brazilian Journal of Plant Physiology**, v. 23, n. 3, p. 231-236, 2011.

MAXWELL, K.; JOHNSON, G.N. Chlorophyll fluorescence: a practical guide. **Journal of Experimental Botany**, v. 51, n. 345, p. 659-668, 2000.

MCCURDY, J.D.; MCELROY, J.S.; KOPSELL, D.A.; SAMS, C.E.; SOROCHAN, J.C. Effects of mesotrione on perennial ryegrass (*Lolium perenne* L.) carotenoid concentrations under varying environmental conditions. **Journal of Agricultural and Food Chemistry**, v. 56, p. 9133–9139, 2008.

MEHLER, A.H. Studies on the reactions of illuminated chloroplasts II - Stimulation on inhibition of the reaction with molecularoxygen. **Archives of Biochemistry and Biophysics**, v. 34, p. 339-351, 1951.

MEHTA, P.; JAJOO, A.; MATHUR, S.; BHARTI, S. Chlorophyll a fluorescence study revealing effects of high salt stress on PS II in wheat leaves. **Plant Physiology and Biochemistry**, v. 48, p. 16–20, 2010.

MEHTA, P.; KRASLAVSKY, V.; BHARTI, S.; ALLAKHVERDIEV, S. I.; JAJOO, A. Analysis of salt stress induced changes in Photosystem II heterogeneity by prompt fluorescence and delayed fluorescence in wheat (*Triticum aestivum*) leaves. **Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology**, v.104, p.308–313, 2011.

MELIS, A. Functional properties of FSIIb in spinach chloroplasts. **Biochimica et Biophysica Acta**, v. 808, p. 334–342, 1985.

MELIS, A. Photosystem-II damage and repair cycle in chloroplasts: Whatmodulates the rate of photodamage in vivo? **Trends in Plant Science**, v.4, p. 130–135, 1999.

MINAGAWA, J. Fluorescence quenching analysis. In: STERN, D.; WITMAN, G. (Ed). **The Chlamydomonas Sourcebook**, 2° ed., v. 3.2008. 2000p

MIYAKE, C.; HORIGUCHI, S.; MAKINO, A.; SHINZAKI, Y.; YAMAMOTO, H.; TOMIZAWA, K. I. Effects of light intensity on cyclic electron flow around FSI and itsrelationship to non-photochemical quenching of Chl fluorescence intobacco leaves. **Plant Cell Physiology**, v. 46, p. 1819–1830, 2005.

MIYAKE, C., SHINZAKI, Y., MIYATA, M. AND TOMIZAWA, K. Enhancement of cyclic electron flow around PSI at high light and its contribution to the induction of non-photochemical quenching (NPQ) of Chl fluorescence in intact leaves of tobacco plants. **Plant Cell Physiology**, v. 45, p. 1426–1433, 2004.

MOZZO, M.; DALL'OSTO, L.; HIENERWADEL, R.; BASSI, R.; CROCE, R. Photoprotection in the antenna complexes of photosystem II. **The Journal of Biological Chemistry**, v. 283, p. 6184–6192, 2008.

MULLER, R.; SCHREIBER, U.; ESCHER, B. I.; QUAYLE, P.; NASHA, S. M. B.; MUELLER, J. F. Rapid exposure assessment of PSII herbicides in surface water using a novel chlorophyll a fluorescence imaging assay. **Science of the total environment**, v. 401, p. 51-59, 2008.

MÜLLER, P.; LI, X. P.; NIYOGI, K.K. Non-photochemical quenching. A response to excess light energy. **Plant Physiology**, v. 125, p. 1558–1566, 2001.

MUNEKAGE, Y.; SHINAKAI, T. Cyclic electron transport through photosystem I. **Plant Biotechnology**, v. 22, p. 361–69, 2005.

MUSTÁRDY L.; GARAB, G. Granum revisited. A three-dimensional model where things fall into place. **Trends in Plant Science**, v. 8, p. 117-122, 2003

NIYOGI, K.K. Photoprotection revisited: genetic and molecular approaches. **Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology**, v. 50, p. 333–359, 1999.

NIYOGI, K.K. Safety valves for photosynthesis. **Current Opinion in Plant Biology**, v. 3, p. 455–460, 2000.

ÖGREEN, E. Photoinhibition of photosynthesis in willow leaves under field conditions. **Planta**, v. 175, p. 229-236, 1988.

- OKAMURA, M.Y.; PADDOCK, M.L.; GRAIGE, M.S.; FEHER, G. Proton and electron transfer in bacterial reaction centers. **Biochimica et Biophysica Acta**, v. 1458, p. 148-163, 2000.
- OUKARROUM, A.; MADIDI, S. E.; SCHANSKER, G.; STRASSER, R. J. Probing the responses of barley cultivars (*Hordeum vulgare* L.) by chlorophyll *a* fluorescence OLKJIP under drought stress and re-watering. **Environmental and Experimental Botany**, v. 60, p. 438–446, 2007.
- PAPAGEORGIU, G.; GOVINDJEE. Light induced changes in the fluorescence yield of chlorophyll *a* in vivo. I. *Anacystis nidulans*, **Biophysical Journal**, v. 8, p. 299–1315, 1968.
- PAPAGEORGIU, G.; GOVINDJEE (Eds.). **Chlorophyll *a* Fluorescence: A Signature of Photosynthesis**, Advances in Photosynthesis and Respiration, Dordrecht: Springer – Verlag, v. 19. 2004, 818p
- PAPAGEORGIU, G.; GOVINDJEE. Photosystem II fluorescence: Slow changes – Scaling from the past q. **Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology**, v. 104, p. 258–270, 2011.
- PEI, Y.; BIE, Z. I. Effects of different irrigation minima on the growth and physiological characteristics of lettuce under plastic greenhouse. **Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering**, v. 23, p. 176-180, 2007.
- PERBONI, A. T.; CASSOL, D.; SILVA, F. S. P.; SILVA, D. M.; BACARIN, M. A. Chlorophyll *a* fluorescence study revealing effects of flooding in canola hybrids. **Biologia**, v. 67, p. 338-346, 2012.
- POWLES, S.B.; YU, Q. Evolution in Action: Plants Resistant to Herbicides. **Annual Review of Plant Biology**, v.61, p. 317–47, 2010.
- RALPH, P. J.; GADEMANN, R. Rapid light curves: A powerful tool to assess photosynthetic activity. **Aquatic Botany**, v. 82, p. 222–237, 2005.

RALPH, P. J.; POLK, S.; MOORE, K. A.; ORTH, R. J.; SMITH, W. A. Operation of the xanthophyll cycle in the seagrass *Zostera marina* in response to variable light.

Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, v. 271, p. 189–207, 2002.

RENGER, G.; ECKERT, H. J.; BERGMANN, A.; BERNARDING, J.; LIU, B.;

NAPIWOTZKI, A.; REIFARTH, F.; EICHLER, H. J. Fluorescence and spectroscopic studies on exciton trapping and electron transfer in photosystem II of higher plants.

Australian Journal of Plant Physiology, v. 22, p. 167–181, 1995.

ROELOFS, T. A.; LEE, C. H.; HOLZWARTH, A. R. Global target analysis of

picosecond chlorophyll fluorescence kinetic from pea chloroplasts. **Biophysical Journal**, v. 61, p. 1147–1163, 1992.

ROHÁČEK, K. Method for resolution and quantification of components of the non-photochemical quenching (qN). **Photosynthesis Research**, v. 105, p. 101–113, 2010.

ROHÁČEK, K. Chlorophyll fluorescence parameters: the definitions, photosynthetic meaning, and mutual relationships. **Photosynthetica**, v. 40, p. 13–29, 2002.

ROMAN, E.S. et al. **Como funcionam os herbicidas**: da biologia à aplicação. Passo Fundo: Gráfica Editora Berthier, 2007. 160p.

SABATE, S.; GRACIA, C.A.; SANCHEZ, A. Likely effects of climate change on growth of *Quercus ilex*, *Pinus halepensis*, *Pinus pinaster*, *Pinus sylvestris* and *Fagus sylvatica* forests in the Mediterranean region. **Forest Ecology and Management**, v. 162, p. 23–37, 2002.

SAGE, R.F. The evolution of C4 photosynthesis. **The New Phytologist**, v. 161, p. 341–370, 2004.

SANDMANN, G. Evolution of carotenoid desaturation: The complication of a simple pathway. **Archives of Biochemistry and Biophysics**, v. 483, p. 169–174, 2009.

SCHANSKER, G.; TÓTH, S. Z.; STRASSER, R. J. Methylviologen and dibromothymoquinone treatments of pea leaves reveal the role of photosystem I in the Chl *a* fluorescence rise OJIP. **Biochimica et Biophysica Acta**, v. 1706, p. 250 – 261, 2005.

SCHREIBER, U. Pulse-Amplitude-Modulation (PAM) fluorometry and saturation pulse method: an overview. In: Papageorgiou, C., Govindjee, (Eds.), **Chlorophyll Fluorescence: A Signature of Photosynthesis**. Dordrecht: Springer - Verlag, p. 279–319, 2004.

SCHREIBER, U.; BILGER, W.; HORMANN, H.; NEUBAUER, C. Chlorophyll fluorescence as a diagnostic tool. Basics and some aspects of practical relevance. In: Raghavendra, A. S. (Ed.) **Photosynthesis: A Comprehensive Treatise**. Cambridge: Cambridge University Press, p. 320–336, 1998.

SCHREIBER, U.; KLUGHAMMER, C. Non-photochemical fluorescence quenching and quantum yields in PS I and PS II: Analysis of heat-induced limitations using Maxi-Imaging-PAM and Dual-PAM-100. **PAM Application Notes**, v. 1, p. 15–18, 2008.

SCHREIBER, U.; KIAHL, M.; KLIMANT, I.; REISING, H. Measurement of chlorophyll fluorescence within leaves using a modified PAM fluorometer with a fiber-optic microprobe. **Photosynthesis Research**, v. 47, n. 1, p. 103-109, 1996.

SCHULTZ, H.R. Extension of a Farquhar model for limitations of leaf photosynthesis induced by light environment, phenology and leaf age in grapevines (*Vitis vinifera* L. cv. White Riesling and Zinfandel). **Functional Plant Biology**, v. 30, p. 673–687, 2003.

SENSEMAN, S. A. (Ed.). **Herbicide handbook**. 9 ed. Lawrence: Weed Science Society of America, 2007. 458p.

SERÔDIO, J.; LAVAUD, J. A model for describing the light response of the nonphotochemical quenching of chlorophyll fluorescence. **Photosynthesis Research**, v. 108, p. 61-76, 2011.

SHIKANAI, T. Cyclic Electron Transport Around Photosystem I: Genetic Approaches. **Annual Review of Plant Biology**, v. 58, p. 199–217, 2007.

SIEFERMANN-HARMS, D. Carotenoids in photosynthesis. I. Location in photosynthetic membranes and light-harvesting function. **Biochimica et Biophysica Acta**, v. 811, p. 325-355, 1985.

SILVA, J. M.; ARRABAÇA, M.C. Photosynthesis in the water-stressed C₄ grass *Setaria sphacelata* is mainly limited by stomata with both rapidly and slowly imposed water déficits. **Physiology Plantarum**, v. 121, p. 409–420, 2004.

SILVA, A. C.; LEONEL, S.; SOUZA, A. P.; DOMINGOS, J. R.; DUCATTI, C. Trocas gasosas e ciclo fotossintético da figueira 'Roxo de Valinhos'. **Ciência Rural**, v.40, p.1270-1276, 2010.

SMIT, M. F.; VAN HEERDEN, P. D. R.; PIENAAR, J. J.; WEISSFLOG, L.; STRASSER, R. J.; KRÜGER, G. H. J. Effect of trifluoroacetate, a persistent degradation product of fluorinated hydrocarbons, on *Phaseolus vulgaris* and *Zea mays*. **Plant Physiology and Biochemistry**, v. 47, p. 623–634, 2009.

SOUSA, C. P.; BACARIN, M. A.; PINTO, J. J. O. Crescimento de espécies bioindicadoras do residual do herbicida (imazethapyr+imazapic), semeadas em rotação com arroz Clearfield®. **Planta Daninha**, v. 30, p. 105-111, 2012.

STIRBET, A.; GOVINDJEE. On the relation between the Kautsky effect (chlorophyll a fluorescence induction) and Photosystem II: Basics and applications of the OJIP fluorescence transient. **Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology**, v. 104, p. 236–257, 2011.

STRASSER, R. J. The grouping model of plant photosynthesis. In: AKOYUNOGLU, G. (Ed) **Chloroplast Development**. North Holland: Elsevier, p. 513-524, 1978.

STRASSER, R.J.; EGGENBERG, P.; PFITER, K.; GOVINDJEE. An equilibrium model for electron transfer in photosystem II acceptor complex: An application to *Chlamydomonas reinhardtii* cells of D1 mutants and those treated with Formate. **Archives Des Science**, v. 45, p. 207–224, 1992.

STRASSER, R.J.; GOVINDJEE. The F_0 and the O-J-I-P fluorescence rise in higher plants and algae. In: ARGYROUDI-AKOYUNOGLU, J.H. (Ed.), **Regulation of Chloroplast Biogenesis**. New York: Plenum Press, p. 423-426, 1992.

STRASSER, R. J.; SRIVASTAVA, A.; GOVINDJEE. Polyphasic chlorophyll a fluorescence transient in plants and cyanobacteria. **Photochemistry and Photobiology**, v. 61, p. 32-42, 1995.

STRASSER, R.J.; SRIVASTAVA, A.; TSIMILLI-MICHAEL, M. The fluorescence transient as a tool to characterize and screen photosynthetic samples. In: YUNUS, M.; PATHRE, U.; MOHANTY, P. (Eds.), **Probing Photosynthesis: Mechanisms, Regulation and Adaptation**. London: Taylor and Francis Press, p. 445–483, 2000.

STRASSER, R.J.; STIRBET, A.D., Heterogeneity of Photosystem II probed by the numerically simulated chlorophyll a fluorescence rise (O-J-I-P). **Mathematics and Computers in Simulation**, v.48, p.3– 9, 1998.

STRASSER, R.J.; STIRBET, A. D. Estimation of the energetic connectivity of PS II centres in plants using the fluorescence rise O–J–I–P; fitting of experimental data to three different PS II models, **Mathematics and Computers in Simulation**, v. 56, p. 451–461, 2001.

STRASSER, B.J.; STRASSER, R.J. Measuring fast fluorescence transients to address environmental question: The JIP test. In: MATHIS, P. (Ed.),

Photosynthesis: From Light to Biosphere. Dordrecht: Kluwer Academic Publisher, vol. V, p. 977–980, 1995.

STRASSER, R.J.; TSIMILLI-MICHAEL, M.; SRIVASTAVA, A. Analysis of the Chlorophyll a fluorescence transient. In: Papageorgiou, C., Govindjee, (Eds.), **Chlorophyll Fluorescence: A Signature of Photosynthesis.** Dordrecht: Springer - Verlag, p. 321–362, 2004.

STRASSER, R. J.; TSIMILLI-MICHAEL, M. Activity and heterogeneity of FSII probed in vivo by the chlorophyll a fluorescence rise O–(K)–J–I–P. In: GARAB, G. (Ed.), **Photosynthesis: Mechanisms and Effects**, Proceedings of the XIth International Congress on Photosynthesis, Budapest, Hungary. Kluwer Academic Publishers, v. 05, p. 4321–4324, 1998.

STREIT, N.M.; CANTERLE, L.P.; CANTO, M.W.; HECKTHEUER, L.H.H. As Clorofilas. **Ciência Rural**, v. 35, p. 748-755, 2005.

SZABO, I.; BERGANTINO, E.; GIACOMETTI, G. M. Light and oxygenic photosynthesis: Energy dissipation as a protection mechanism against photo-oxidation. **EMBO Reports**, v. 6, p. 629–634, 2005.

TAIZ, L.; ZEIGER, E. **Fisiologia Vegetal.** São Paulo: Artmed, 2009. 819p

THACH, L. B.; SHAPCOTT, A.; SCHMIDT, S.; CRITCHLEY, C. The OJIP fast fluorescence rise characterizes *Graptophyllum* species and their stress responses. **Photosynthesis Research**, v. 94, p. 423-436, 2007.

TING, C. S.; OWENS, T. G. Limitations of the Pulse-Modulated Technique for Measuring the Fluorescence Characteristics of Algae. *Plant Physiology*, v. 100, p. 367-373, 1992.

TRIANAPHYLIDE`S, C.; HAVAUX, M. Singlet oxygen in plants: Production, detoxification and signaling. **Trends in Plant Science**, v. 14, p. 219–228, 2009.

TÓTH, S. Z.; SCHANSKER, G.; GARAB, G.; STRASSER, R. J. Photosynthetic electron transport activity in heat-treated barley leaves: The role of internal alternative electron donors to photosystem II. **Biochimica et Biophysica Acta**, v. 1767, p. 295–305, 2007.

vanKOOTEN, O.; SNEL, J. F. H. The use of chlorophyll fluorescence nomenclature in plant stress physiology. **Photosynthesis Research**, v. 25, p. 147-150, 1990.

WARREN, C.R. The photosynthetic limitation posed by internal conductance to CO₂ movement is increased by nutrient supply. **Journal of Experimental Botany**, v. 55, p. 2313–2321, 2004.

WETTSTEIN, D.V.; GOUGH, S.; KANNANGARA, C.G. Chlorophyll Biosynthesis. **The Plant Cell**, v. 7, p. 1039-1057, 1995.

WILLIAMSON, A.; CONLAN, B.; HILLIER, W.; WYDRZYNSKI, T. The evolution of Photosystem II: Insights into the past and future. **Photosynthesis Research**, v.107, p. 71–86, 2011.

WILSON, K.B.; BALDOCCHI, D.D.; HANSON, P.J. Quantifying stomatal and non-stomatal limitations to carbon assimilation resulting from leaf aging and drought in mature deciduous tree species. **Tree Physiology**, v. 20, p. 787–797, 2000.

WU, J.; NEIMANIS, S.; HEBER, U. Photorespiration is more effective than the Mehler reaction in protecting the photosynthetic apparatus against photoinhibition. **Botanica Acta**, v. 104, p. 283–281, 1991.

XIONG, J.; SUBRAMANIAM, S., GOVINDJEE. Modeling of the D1/D2 proteins and cofactors of the photosystem II reaction center: Implications for herbicide and bicarbonate binding. **Protein Science**, v. 5, p. 2054–2073, 1996.

YUSUF, M.A.; KUMAR, D.; RAJWANSHI, R.; STRASSER, R.J.; TSIMILLI-MICHAEL, M.; GOVINDJEE; SARIN, N.B. Overexpression of γ -tocopherol methyl transferase gene in transgenic *Brassica juncea* plants alleviates abiotic stress: Physiological and

chlorophyll a fluorescence measurements. **Biochimica et Biophysica Acta**, v. 1797, p. 1428-1438, 2010.

ZHU, X.G.; GOVINDJEE; BAKER, N.R.; STURLER, E.; ORT, D.R.; LONG, S.P.
Chlorophyll a fluorescence induction kinetics in leaves predicted from a model describing each discrete step of excitation energy and electron transfer associated with photosystem II. **Planta**, v. 223, p. 114–133, 2005.

ZHU, X.G.; SHAN, L.; WANG, Y.; QUICK, W.P. C₄ Rice – an ideal arena for systems biology research. **Journal of Integrative Plant Biology**, v.52, p. 762–770, 2010.